

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αύξηση της παραγωγής και της μετασυλλεκτικής ζωής με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας σε πολλά φρούτα και λαχανικά.
- Πλήρης εφοδιασμός από το φύλλωμα των καλλιεργειών με Ασβεστίου με ταυτόχρονη συμπλήρωση των απαραίτητων πιοσοτήτων σε Άζωτο, Μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.
- Αποδοτικότερη μορφή Ασβεστίου σε σχέση με τα συνήθη μονά ασβεστούχα άλατα.
- Άριστος συνδυασμός στο βυτίο με τα συνήθη προϊόντα φυτοπροστασίας.
- Ρύθμιση σε επιθυμητό βαθμό του pH του ψεκαστικού διαλύματος, λόγω των παραγόντων της τεχνολογίας ΒΙΟΦΟΛ.
- Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- Άριστη αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Το προϊόν πρέπει να προστίθεται στο βυτίο του ψεκαστικού συγχρόνως με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση.
- Τα άλλα γεωργικά φάρμακα πρέπει να προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας της ανάμιξης.
- Ψεκάστε αμέσως το ψεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	%β/β
Συνολικό άζωτο	N 10,0
Νιτρικό άζωτο	NO ₃ -N 8,5
Καρβαμιδικό άζωτο	NH ₂ -N 1,3
Υδατοδιαλυτό ασβεστίο	CaO 15,0
Υδατοδιαλυτό μαγνήσιο	MgO 2,0
Υδατοδιαλυτό βόριο (βορικό οξύ)	B 0,05
Υδατοδιαλυτός χηλικός χαλκός (EDTA)	Cu 0,04
Υδατοδιαλυτός χηλικός σίδηρος (EDTA)	Fe 0,05
Υδατοδιαλυτό χηλικός μαγγάνιο (EDTA)	Mn 0,10
Υδατοδιαλυτό μολυβδανίο (μολυβδικό νάτριο)	Mo 0,001
Υδατοδιαλυτός χηλικός ψευδάργυρος (EDTA)	Zn 0,02
Άλλα συστατικά:	
• Χηλικοί παράγοντες	
• Προστατευτικοί παράγοντες	
• Βιοδραστικά συστατικά	

Κ&ΝE EARTH MATTERS

ΒΙΟΦΟΛ CaO

**Υδατικό Κρυσταλλικό Αιώρημα
Νιτρικού Ασβεστίου
με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία.
10 - 0 - 0 + 15 CaO + 2 Mg + ιχνοστοιχεία
Για διαφυλλικές εφαρμογές**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΛΑΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ.

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί οσφρή οιφθαλμική βλάβη.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απομικής προστασίας για τα μάτα/πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε οδηγείσα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιτύλνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ ή ένα γιατρό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: 210 77 93 777

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο (1,6 κιλά)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **ΒΙΟΦΟΛ CaO** είναι εξειδικευμένο διαφυλλικό λίπασμα με στόχο την πρόληψη προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη ασβεστίου, όπως η πικρή κηλιδώση στα μήλα, τα επιφανειακά εγκαύματα στα αχλάδια, το σκάσιμο καρπών στα κεράσια και τα δαμάσκηνα, ο σπογγώδης καρπός στις φράουλες, το σάπισμα στην άκρη του καρπού στις τομάτες, στις πιπεριές, στα καρπούζια και στο αβοκάντο, το κάψιμο της κορυφής και το μαύρισμα της καρδιάς στα μαρούλια, σέλινα και λάχανα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Μηλοειδή: 200-500cc/στρ. 3-6 μηνιαίες εφαρμογές ανάλογα με την ένταση του προβλήματος. Από το σχηματισμό του καρπού μέχρι και λίγο πριν τη συγκομιδή.

Πυρηνόκαρπα: 300-500cc/στρ. 4-5 εφαρμογές ανά 14 ημέρες από το σχηματισμό του καρπού μέχρι και πριν τη συγκομιδή. Ειδικά για τα κεράσια, ο ψεκασμός 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση του σκασίματος των καρπών.

Αμπέλι: 300-500cc/στρ. 2-3 φορές με μεσοδιάστημα 14 ημερών. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται μετά το δέσιμο των ραγών. Πρέπει να γίνεται καλός ψεκασμός των τσαμπιών.

Εσπεριδοειδή: 300-400cc/στρ. 2-3 εφαρμογές κατά την περίοδο διάγκωσης.

Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Καρπούζι, Μποστανικά: 200-500cc/στρ. (Υ), 200-400cc/100lt ψεκ. υγρού (Θ). Συνεχόμενοι ψεκασμοί ανά 10-14 ημέρες από το σχηματισμό των πρώτων καρπών και μέχρι 10-15 μέρες πριν από τη συγκομιδή.

Λάχανο, Κουνουπίδι, Μαρούλι, Σέλινο: 200-400cc/στρ. (Υ) 200-400cc /100lt ψεκ. υγρού (Θ). 1-3 ψεκασμοί προληπτικά ή ανάλογα με την ένταση του προβλήματος. Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται λίγο πριν το σχηματισμό της κεφαλής.

Φράουλα: 200-400cc/στρ. Μαζί με τους 2-3 ψεκασμούς με φ.π. πριν τη συγκομιδή

Λοιπές Καλλιέργειες: 200-600cc/στρ. ή 200-300cc/100lt ψεκ. υγρού ανάλογα με την καλλιέργεια. Ψεκασμός ανά 10-15 ημέρες με καλή διαβροχή των καρπών, λόγω αδυναμίας ταχείας μεταφοράς του Ca από τα φύλλα στους καρπούς.

Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150lt/στρ.

ANAKINEΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρασκευαστής: AGLUKON GERMANY

Διανομή: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ.48, 570 22, Σινόδος

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

