

Geraniol + Thymol (Χημική ομάδα οξυγονωμένων μονοτερπενίων)

Αιώρημα μικροκαψουλών

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Geraniol: 12,1% β/ο
Thymol: 4,1% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83,83% βιβ

UFI: MC36-M3C2-H118-DSCQ

KΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν»

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 4,5 λίτρα

Κάτοχος της άδειας:

Tamino BVBA, Pantserchipstraat 207, 9000 Ghent, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 3073/27-07-2020

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Νηματωδοκτόνο επαφής, για χρήση μέσω της στάγδην άρδευσης σε υπαίθριες και θερμοκηπτικές καλλιέργειες. Συνδυασμός δυο δραστικών ουσιών: geraniol και thymol. Προορίζεται για τον έλεγχο φυτοπαρσιτικών νηματωδών του γένους *Meloidogyne* (κομπονηματωδών). Δρα σε πολλαπλά σημεία: η δ.ο. geraniol περιορίζει την προσβολή (αριθμό κόμβων), αναστέλλοντας την εκκόλαψη των αυγών και την κινητικότητα των νεαρών μορφών, ενώ η δ.ο. thymol προκαλεί ακινητοποίηση των νεαρών μορφών και αναστέλλει την εκκόλαψη των αυγών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Φρούλα (Υ&Θ): Για Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp, *Meloidogyne incognita*), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Σολανώδη: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά-Γλυκοπιπεριά, Πιπεριά Chilli, Μπτάμια (Υ&Θ): Για Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp, *Meloidogyne incognita*), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι (Υ&Θ): Για Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp, *Meloidogyne incognita*), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Ακτινιδία* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Σκόρδο* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Νηματώδεις (*Ditylenchus dipsaci*), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Κρεμμυδι: Για Νηματώδεις (*Ditylenchus dipsaci*, *Ditylenchus* sp.) (χρήση ήσσονος σημασίας), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Κρεμμυδι φρέσκο* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Νηματώδεις (*Ditylenchus dipsaci*, *Ditylenchus* sp.), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Φασόλι με λοβό και χωρίς λοβό (Υ+Θ), Σοπρί (Φασόλι): Για Νηματώδεις* (*Meloidogyne* sp, *Heterodera* sp, *Globodera*) (χρήση ήσσονος σημασίας), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

Σοπρί (Ρεβίθι*) (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Νηματώδεις (*Meloidogyne* sp, *Heterodera* sp., *Globodera*), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης ή άλλων συστημάτων άρδευσης, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σε κάθε περίπτωση μετά την εφαρμογή του σκευάσματος το έδαφος πρέπει να διατηρηθεί υγρό, πότισμα.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ακτινιδιάς, του σκόρδου, του κρεμμυδιού, του φρέσκου κρεμμυδιού, των φασολιών και του ρεβιθιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος με το σύστημα της στάγδην άρδευσης κατά ή μετά τη μεταφύτευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη/δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης, με τη χρήση δοσομετρητή και με τον αναθεωρητή σε λειτουργία. Αφού αρχικά έχετε ποτίσει με τη μισή ποσότητα νερού, εφαρμόστε το προϊόν, με 20% του συνολικού όγκου νερού. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, να συνεχίζεται το πότισμα με καθαρό νερό, με το υπόλοιπο 30 % του συνολικού όγκου, ώστε να γίνει σωστή κατανομή του προϊόντος στην ριζοσφαίρα καθώς και να καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης. Να μη χρησιμοποιείται μεγαλύτερος όγκος νερού για το έλκωμα του συστήματος της στάγδην άρδευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η έκπλυση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι καλλιέργειες:—

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες έπλυνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό έλκωμα (τα νερά του έλκωματος ριχνονται στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΨΑΛΗΣ: *Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. • Να φοράτε προστατευτικό γάντι/α προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Διάθεση του περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. •Φοράτε γάντια ολόκληρη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη και φόρτωση του σκευάσματος. •Σε περίπτωση επανεπείδου, θα πρέπει να φοράτε μακριά παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. Συνιστάται η χρήση γαντιών.»

•Μην ρυτνίζετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αulές αγροκτημάτων και δρόμους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε επισκεφτείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχορησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επάνω, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΝΑΤΡΗΣΙΑΕΩΝ γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε από το δοχείο ή την ετικέτα. Πιείτε ένα ποτήρι νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΝΑΤΡΗΣΙΑΕΩΝ: 210 77 93 777

UFI: MC36-M3C2-H118-DSCQ

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε συσκευασία

