

Credit[®] 36 SL



Glyphosate (γκλυφοσεΐτ) 36%

Ομάδα φωσφονογλυκινών

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγραμμένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Glyphosate οξύ 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 48,6% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 67,83% β/β

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκάσμό, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν:

- αφεκάστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή **1 μέτρου** από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκάσμου κατά 50%, για τη δόση 400-600 κ.εκ./στρ. ή **1 μέτρου** από τη μη γεωργική γη σε συνδυασμό με τη χρηση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκάσμου κατά 75%, για τη δόση 1000 κ.εκ./στρ.

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70336/18-06-2019

Κάτοχος της άδειας / Παρασκευαστής:
Nufarm GmbH & Co, KG, St-Peter Strasse 25,
4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

1123

K&N EARTH MATTERS
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος,
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Nufarm
Grow a better tomorrow

Περιεχόμενο:
20 λίτρα e



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Credit[®] είναι διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία glyphosate. Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρουτ, Κιτριά), **ΑΚΡΟΔΡΥΑ** (Αμυγδαλιά), **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά), **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά), **Αμπέλια** (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), **Ελιά:** α) **Ετήσια ζιζάνια** (*) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): Δύο εφαρμογές κατά την ζωρή ανάπτυξη των ζιζανίων με 150-200 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Συγκεκριμένα για τα ζιζάνια: Μόλοχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμμι, Αντράκλα, η δόση είναι 400-600 κ.εκ./στρέμμα. β) **Πολυετή ζιζάνια** (**) (αγρωστώδη και πλατύφυλλα): Μία (1) εφαρμογή κοντά, κατά ή λίγο μετά την άνθηση των ζιζανίων με 500-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ. (ανάλογα με το είδος). Ειδικές εφαρμογές: Αγριάδα 750-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ., Βέλιουρας 500 κ.εκ. σκευάσ./στρ., Φτέρη 500 κ.εκ. σκευάσ./στρ, Περιοκλάδα 1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Για Κύπερη δύο (2) εφαρμογές: α) 600 κ.εκ. σκευάσ./στρ. κατά την άνθηση και β) 500 κ.εκ. σκευάσ./στρ. σε περίπτωση αναβλάστησης. Όγκος ψεκάστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. **Βαμβάκι:** Μία εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκάσμο μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης με 150-200 κ.εκ. σκευάσ./στρ. για ετήσια (*) και με 500 κ.εκ. σκευάσ./στρ. για πολυετή (*Sorghum halepense*). Όγκος ψεκάστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρ. **Καπνός:** Για την αντιμετώπιση της οροβάγχης εφαρμόζονται δύο (2) ψεκάσμοι καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά την μεταφύτευση με δόση 40 κ.εκ. σκευάσ./στρ. και β) 60 ημέρες μετά την μεταφύτευση με δόση 60 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Όγκος ψεκάστικού υγρού 30-40 λίτρα/στρ. **Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:** α) **Ετήσια ζιζάνια** (*): Μία (1) εφαρμογή και β) **Πολυετή** (**): Μία (1) εφαρμογή με τις ανωτέρω δόσεις/οδηγίες. Όγκος ψεκάστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρ. **Ακαλλιέργητες εκτάσεις:** α) Δύο (2) εφαρμογές για τα ετήσια ζιζάνια (*) και β) μία (1) για τα πολυετή ζιζάνια (**) με τις ανωτέρω δόσεις/οδηγίες. γ) Ξυλωδείς θάμνοι, βάτα κλπ.: Μία (1) εφαρμογή στην πλήρη ανάπτυξη με 500-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ. Όγκος ψεκάστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρ. **Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών:** Υδροχαρή ζιζάνια: Μία (1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων με 800-1000 κ.εκ. σκευάσ./στρ.

(*) Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνθήκες μία με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης.

(**) Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνθήκες μία εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή.

(***) Στο βαμβάκι ο ψεκάσμος πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκάστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στις δένδρως καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκάσμος των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκάστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πλεγές κλαδέματος. Ο ψεκάσμος επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva spp.* (μολόχες), *Urtica spp.* (τσουκνίδες), *Polygonum spp.* (πολυκόμμι, λαπάτσα), *Portulaca sp.* (αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 3. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά. 4. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 5. Να μην γίνεται ψεκάσμος, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 10. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 11. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν ή υπάρχει αμφιβολία αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό και κάτω από τα βλέφαρα. Εφόσον ο ερεθισμός των οφθαλμών παραμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Εφόσον ο ερεθισμός του δέρματος παραμένει, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν, καλέστε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στομάχι. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου. Χρηγήστε ενεργό άνθρακα. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τρόπος εφαρμογής: Ομοίομορφος ψεκάσμος του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκάστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή τυχόν συσφύρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκάσμο καλύψεως της φύτευσης.

Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.

Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **Καθαρισμός των ψεκάστικών μηχανών:** Αδειάστε τελείως το ψεκάστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκάστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

• Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.

• Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκάσμος των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκάστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: • Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκάστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Για όλες τις καλλιέργειες 7 ημέρες.

Συνθήκες αποθηκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επι
Αριθμός παρτίδας: της συσκευασίας



MEΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1123