



CREDIT[®] XTREME

540 SL

Glyphosate (γκλυφοσέιτ) 54%

Ομάδα φωσφονογλυκινών

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Glyphosate οξύ 54% β/ο
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης 40,08 % β/ο και άλατος Καλίου 29,77 % β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 56.33% β/β

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση ανανέωσης στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα **φύτα μη στόχους** να αφήσετε μίαν:

-αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή **1 μέτρου** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** για δόσεις των **665 κ.εκ./στρ.**

-αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή **1 μέτρου** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** για τις δόσεις **333-533κ.εκ./στρ.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70409 / 12-01-2021

Κάτοχος της άδειας:

Nufarm GmbH & Co. KG,
St-Peter Strasse 26, 4021 Linz,
Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/

Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



0121

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόε.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr



Grow a better tomorrow

Περιεχόμενο:
15 λίτρα e

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Credit Xtreme 540 SL είναι διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστητική ουσία glyphosate. Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ενζύμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Τρόπος εφαρμογής: -Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μικρό τύπου σκουπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30PSI). Εφαρμόγείτε με ειδικό οχονοδιαδρεκτικό φέρονε στο χέρι ή προσρομιμένο σε τρακτέρ. Για ζιζάνια υψηλότερα από το ύψος της καλλιέργειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός των ψεκαστικών μηχανών: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: -

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστητική ουσία glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν τα συμπτώματα παραμένουν καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο και πλύνετε κάτω από τα βλεφαρα. Εφόσον ο ερεθισμός των οφθαλμών παραμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο. Εφόσον ο ερεθισμός του δέρματος παραμένει, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Ματακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον σε ηρεμία και διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητό, ξαπλώστε στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερο από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισά στραμμένα. Εφόσον τα συμπτώματα παραμένουν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):

Δενδρώδεις καλλιέργειες: Εοπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιές, Ακτινίδιο, Αμέλια: **7 ημέρες.**

Καλαμιές των καλλιεργειών (Σιτάρι, Κριθάρι, Σικάλη, Βρώμη, Σπέλτα, Ελαιοκράμβη, Ηλιάνθος, Αραβόσιτος): **Δεν ορίζεται** (μετασυσλεκτική εφαρμογή).

Λιβάδια, γκαζόν (για καταστροφή ή ανανέωση της καλλιέργειας πριν την σπορά), Ακαλλιεργήτες εκτάσεις, Φυτώρια δενδρυλλίων (δοσικών, ανθοκομικών, κωνοφόρων), Όλες οι γραμμικές καλλιέργειες μετά τη συγκομιδή (προσπαρτική ή μεταπαρτική/προφυτρωτική εφαρμογή), Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: **Δεν ορίζεται.**

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 3 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται από πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ημ/νία παραγωγής: Βλέπε επί της
Αριθμ. παρτίδας: συσκευασίας

bar code



ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ



0121

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Όλες οι γραμμικές καλλιέργειες⁽¹⁾ μετά τη συγκομιδή (Αγροί την άνοιξη και το φθινόπωρο): α) Προσπαρτικά των καλλιεργειών για την προετοιμασία του εδάφους, μία (1) εφαρμογή για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων με δόση 100-400 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. β) Μεταπαρτικά/προφυτρωτικά των καλλιεργειών αν έχουν εμφανισθεί ζιζάνια στο αγρό να γίνεται μία (1) εφαρμογή για την αντιμετώπιση ετήσιων(*) ζιζανίων με δόση 100-200 κ.εκ./στρέμμα. και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Καλαμιές των καλλιεργειών: Σιτήρα (Σιτάρι, Κριθάρι, Σικάλη, Βρώμη, Σπέλτα), Ελακοκράμβη, Ηλιάνθος, Αραβόσιτος: Ένας (1) ψεκασμός της καλαμιάς μετά τη συγκομιδή για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων με δόση 100-400 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Δενδρώδεις καλλιέργειες⁽²⁾: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά), ΑΚΡΟΔΑΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά, Κουκουναριά), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδάκινια, Κερασιά, Δαμασκηνιά), Ακτινίδιο, Ελιά⁽³⁾: Δύο (2) εφαρμογές μεταφυτευτικά ως προς τα ετήσια(*) ζιζάνια, κάτω από τα δένδρα ή σε λωρίδες (Άνοιξη - νωρίς το καλοκαίρι) με δόση 100-266 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με ψεκαστήρα πλάτης. Μείγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2 εφαρμογές / 28 ημέρες.

Αμπέλια (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): Δύο (2) εφαρμογές μεταφυτευτικά ως προς τα ετήσια(*) ζιζάνια, στις γραμμές ή μεταξύ των γραμμών με δόση 100-266 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα. Μείγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2 εφαρμογές / 28 ημέρες.

Λιβάδια, γκαζόν (για καταστροφή ή ανανέωση της καλλιέργειας πριν την σπορά): Μία (1) εφαρμογή κατά την ανάπτυξη της βλάστησης των ζιζανίων και πριν από τη σπορά για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων με δόση 100-400 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Μία (1) εφαρμογή κατά την ανάπτυξη της βλάστησης (Άνοιξη με φθινόπωρο) για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων με δόση 100-333 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Φυτάρια δενδρυλλίων (δασικών, ανθοκομικών, κωνοφόρων): α) Μία (1) εφαρμογή κατά την περίοδο ανάπτυξης των ζιζανίων για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων με μέγιστη (max) δόση 500 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα. Οι εφαρμογές να γίνονται μεταξύ των γραμμών με χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπνών) (Μάιος-Σεπτέμβριος). β) Μία (1) εφαρμογή κατά την περίοδο που σταματά η ανάπτυξη των ετήσιων(*) ζιζανίων (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος) με μέγιστη (max) δόση 200 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρέμμα. γ) Μία (1) εφαρμογή ανά μεμονωμένο φυτό/ζιζάνιο με ειδικό σχοινοδιαβρέκτη φερόμενο στο χέρι ή προσαρμοσμένο σε τρακτέρ για την αντιμετώπιση των ετήσιων(*) και των πολυετών(**) ζιζανίων ψηλοτέρων από το ύψος της καλλιέργειας κατά την περίοδο ανάπτυξής τους (Μάιο-Σεπτέμβριο) με μέγιστη (max) δόση 665 κ.εκ.σκούμ./στρέμμα.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών⁽⁶⁾: Ετήσια ζιζάνια(*): Μία (1) εφαρμογή κοντά στην περίοδο βλάστησης των ζιζανίων με μέγιστη (max) δόση 267 κ.εκ.σκούμ./στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Οι χρήσεις για όλες τις καλλιέργειες αφορούν για την προετοιμασία του εδάφους ή για χρήση μεταπαρτικά / προφυτρωτικά στις γραμμικές καλλιέργειες συμπεριλαμβανοντας: κονδυλώδη και βολβώδη λαχανικά, λαχανικά, με στέλεχος, όσπρια, ελαιούχα φυτά (θαμνιά, ηλιάνθοι, ελακοκράμβη), πατάτες, σιτηρών και τεύτλων. Το PHI καλύπτει από το χρόνο μεταξύ της εφαρμογής και της συγκομιδής. 2. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυώδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3^ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολειμμένα. 6. Η εφαρμογή κατά μήκος των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. Απαιτείται διάστημα 7 ημερών μετά την εφαρμογή για το γέμισμα των καναλιών. 7. Για την αγριόδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά. 8. Για τη φέτρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδιπλώνει της κορυφής. 9. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 10. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για αποπορρωγάνη. 11. Μην ψεκάτετε όταν φούσκες. 12. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 13. Χρησιμοποιήστε υλικά ή γεωργικές πρακτικές για να αποφύγετε την επαφή των φυτών με τη δραστική ουσία ή με το έδαφος που έχει υποστεί εφαρμογή με τη δραστική ουσία.

*Καταπολεμώμενα ετήσια ζιζάνια:

- με δόση έως 266 κ.εκ./στρ.: Βρώμος *Bromus sp.*, Λεπτή Ήρα *Lolium rigidum*, Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*).

- επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 333 κ.εκ./στρ. (μόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των πλατυφυλλων ζιζανίων): Μολόχες (*Malva sp.*), Τσουκνίδες (*Urtica sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

- επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 400 κ.εκ./στρ.: Μολόχες (*Malva sp.*), Τσουκνίδες (*Urtica sp.*), Πολυκόμπι (*Polygonum sp.*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*).

- επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 500 κ.εκ./στρ.: Βελονιάδα μαλακοειδής (*Erodium malacoides*), Δωδεκάνησ (*Lamium amplexicaule*), Κοινή Πόα (*Poa annua*).

- επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 665 κ.εκ./στρ.: Κεχροσέτάρια (*Setaria italica*), Γεράνι (*Geranium rotundifolium*), Μαργαρίτα (*Glebionis coronarium*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*).

** Καταπολεμώμενα πολυετή ζιζάνια:

- με δόση έως 333 κ.εκ./στρ.: Φτέρη (*Pteridium aquilinum*), Ευλώδεις θάμνοι: Βάτα (*Rubus sp.*)

- επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 665 κ.εκ./στρ.: Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριόδα (*Cynodon dactylon*), Οξάλιδα (*Oxalis pes-caprae*), Ραδίκι (*Cichorium intybus*), Αγριοραδίκι (*Taraxacum officinale*), *Diplotaxis virgata*.