



ERADICOAT® MAX

Maltodextrin 47,6%
ομάδα polysaccharide

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Maltodextrin: 47,6% β/β
Βοηθητικές ουσίες 60% β/β

UFI: 5369-60WV-100P-VHW8

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα

Κάτοχος της άδειας:
Certis Europe B.V.,
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14726 / 23-10-2019



ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ



425498

ERADICOAT® MAX

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως Αλευρώδων και Ακάρεων. Περιέχει τη δραστική ουσία maltodextrin, η οποία δρα εναντίον των εντόμων με μηχανικό τρόπο, παρεμποδίζοντας την ανστροφή προκαλώντας τους ασφυξία ή ακινητοποιώντας τα στην επιφάνεια των φυλλών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιεργείες θερμοκήπιου (Θ): Για Αλευρώδεις (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) και για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) με δόση 2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 6 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, Πράσινο Λεμόνι (Λάιμ)): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*) και για Κοκκοειδή (*Planococcus sp.*, *Icerya purchasi*, *Deliothrips abietis*) με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της ανθής έως τη συγκομιδή.

Αχλάδι: Για Φύλλα (*Caspariopsis lyali*), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της ανθής έως τη συγκομιδή.

Ακρόδρια (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά): Για Κοκκοειδή (*Planococcus sp.*, *Icerya purchasi*, *Deliothrips abietis*) με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της ανθής έως τη συγκομιδή.

Μπανάνια, Αβόκάντο, Μάνγκο, Πατάνια, Ανανάς: Για Κοκκοειδή (*Planococcus sp.*, *Icerya purchasi*, *Deliothrips abietis*) με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της ανθής έως τη συγκομιδή.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Για Κοκκοειδή (*Planococcus ficus*, *Rhipidosiphum citri*), με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 2,25 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της ανθής έως τη συγκομιδή.

Αμπέλι (ονοποτήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για Ακάρεα - *Erythritus* (*Calatrimetus vilis*, *Colomerus sp.*, *Colomerus vilis*), με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 2,25 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών έως την εμφάνιση των ταξιανθιών.

Μαρούλια και σαλατικά (Υ): Μαρούλι (Υ), Ρόκα (Υ), Κόκκινο σινάπι (Υ), Κάρδαμο (Υ), Γαιοκάρδαμο (Υ), Σπανάκι (Υ), Σέσκουλο/φύλλα τεύτλων (Υ), Σκαρόλες (πικραλίδα)/πλάταφυλλα σινιόβι (Υ), Για Αφίδες (*Nasonovia pisinigris*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum euphorbiae*), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Φράουλα (υπαίθρια): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Σολανώδη (Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ)): Για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) και για Αλευρώδεις (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes*

vaporariorum), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Κοκκινόβουδο (εδωδιός φλοιός) (Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκύθι (Υ)): Για Αλευρώδεις (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Κοκκινόβουδο (μη εδωδιός φλοιός) (Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ)): Για Αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*), για Τετράνυχους (*Tetranychus urticae*) και για Αλευρώδεις (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα φεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος φεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.

Μείγματος αρίθμος εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Καλλιεργείες θερμοκήπιου (Θ): 20 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών. Εσπεριδοειδή, Αχλάδι, Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες), Αμπέλι (ονοποτήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες), Ακρόδρια (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά), Μπανάνια, Αβόκάντο, Μάνγκο, Πατάνια, Ανανάς: 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών. Μαρούλια και σαλατικά (Υ), Φράουλα (υπαίθρια), Σολανώδη (Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ)), Κοκκινόβουδο (εδωδιός φλοιός) (Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκύθι (Υ)), Κοκκινόβουδο (μη εδωδιός φλοιός) (Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ)): 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Η χρήση στη Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τα Περγαμόντα και τα Νεράντζα. Η χρήση στη Λεμονιά περιλαμβάνει και τα Κιτρολόιμνα Η χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει και τις Κλημεντίνες. Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τις Φράπτες.

2) Στο θερμοκήπιο εφαρμόζεται με δόσολογία 2%, δηλαδή με δόση 20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

3) Σης καλλιεργείες θερμοκήπιου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φυλλών, να παραμεινούν κλειστά όλο ο πόρος και τα παράθυρα.

4) Σης καλλιεργείες υπαίθριου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, Σολανώδη, Φράουλα και Κοκκινόβουδο εφαρμόζεται με δόσολογία 15-20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

* Καλλιεργείες θερμοκήπιου (Θ):

Σολανώδη: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά Chilli, Πεπόνια, Πατάτα.

Κοκκινόβουδο: Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα.

Καρυδοειδή: Λάχανο Λευκό, Λάχανο Κόκκινο, Αγγούρι Savoy, Λαχανάκια Βρυξέλλας, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο Κινέζικο, Λάχανο Σγουρό, Λαχανάκια.

Φυλλώδη Λαχανικά: Αντιόξι, Αντράκκα, Βλήτη, Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, Κουκινόλαρο, Λάπθο, Λουκτορίλλο, Μαρούλι, Μαρούλι κατσαρό, Αποκαρδισμένα, Αραχίδα.

Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό, Κρεμμύδι φρέσκο, Σκόρδο, Πράσο, Σχινόσπαρας, Ασκαλόνα, Ραπανάκι, Καρότο.

Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Άνθος, Αρώνια, Βασιλικός, Γασμέρι, Γλυκάνισος, Δυόσμος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Εστραγκόν, Θυμάρι, Κάππαρη, Κορίανδρος, Κύμινο, Λεβάντα, Μαϊντανός, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Ρίγανη, Σάλβια, Σέλινο, Σχοινόπρασο, Υσώπος, Φασκόμηλο, Χαρούλη.

Καλλωπιστικά: Αζαλέα Αλεξανδρινή, Αφρικανική Βιοκέτα, Γαρφαλλιά, Γλαδίστο / Γυμνόστηλο, Ζέρμπερα, Κυκλάμινα, Μπιμόνια, Ντάλια, Ορτανσία, Πελαργόνιο, Πριμούλα, Τούλιπα, Τριανταφυλλιά, Σαμπότσκος, Χρυσάνθεμα.

Φράουλα Κατανοστήρα:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιεργείες. Μη εφαρμογή (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνεύσετε ενεργά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε γάντια, ολοσχημ προστατευτική ενδυμασία και προσοχή κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού». Διάθεση του περιεχομένου/παρασκευάσματος με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί ρύπανση μέσα των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε αδιάφορα για 72 ώρες προστασίες 5 μέτρων από μη γεωργική γη. Εκτινδύουν για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνως μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιεργείες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιδιώκουμε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντιδότο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσχυση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύσιμο (να νερό της φυλλώματος τα ριγόμενα στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενες με τρύπανο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χημικής, αναπνευστικής σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική εφαρμογική συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αερισμένο και προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε στην επιφάνεια του δοχείου



425499