

verno™ FG Cu + Zn

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ): Εφαρμόστε 200 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητο.

Αβοκάντο: Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), 4-6 εφαρμογές από την έναρξη της βλαστικής περιόδου, πριν την άνθιση, κατά την άνθιση και στο στάδιο της καρπούδεσης.

Μπανάνα: Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), 3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του βλαστικής περιόδου και της καρποφορίας.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινο, Κεράσι, Βερίκκοκο, Δαμάσκηνο): Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητο.

Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια): Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητο.

Ελιά: Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητο.

Ακρόδρυα (Αμυγδαλά, Καρυδά, Φυστικά, Φουντουκιά, Καστανιά): Εφαρμόστε 150 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο. Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητο.

Αμπέλη: Εφαρμόστε 50-100 γρ/στρέμμα (50-100 γρ/100 λίτρα νερό). Πολλαπλές εφαρμογές στα στάδια πριν την άνθιση, μετά την άνθιση και μετά τη συγκομιδή.

Οσπρια και ψυχανθή (Φακές, Ρεβύθια, Φασόλια, Αρακάς, κ.ά.): Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερό). Χρόνος εφαρμογής: α) πριν την άνθιση, όταν η καλλιέργεια έχει υψος 10-15 εκ. και β) κατά τα αρχικά στάδια του σχηματισμού του λοβού.

Πατάτα: Εφαρμόστε 100 γρ/στρέμμα (100 γρ/100 λίτρα νερό), 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Σολανώδη (Τομάτα, Βιομηχανική τομάτα, Πιπεριά): Εφαρμόστε 50-100γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: α) δύο εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση, β) πριν την άνθιση, γ) και δ) στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών.

Κολοκυθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι): Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: Αγγούρι, Κολοκύθι: α) δύο εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση, β) πριν την άνθιση, γ) και δ) στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών. **Καρπούζι:** πολλαπλές εφαρμογές στα στάδια πριν την άνθιση, μετά την άνθιση και μετά τη συγκομιδή.

Σταυροθειό (Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίτι): Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Κρεμμύδι, Σκόρδο: Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: α) στο βλαστικό στάδιο και β) κατά το στάδιο του σχηματισμού του βολβού.

Καρότο, Παντζάρι: Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Καλαμπόκι: Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: 2 εβδομάδες μετά το φύτρωμα των σπόρων και επανάληψη μετά από 1 μήνα.

Ρύζι: Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: α) στο στάδιο του 4ου φύλου, β) στο αδέλφωμα και γ) νωρίς στο στάδιο γεμίσματος του σπόρου.

Σιτάρι, Κριθάρι: Εφαρμόστε 25-50 γρ/στρέμμα (50 γρ/100 λίτρα νερού). Χρόνος εφαρμογής: α) στο στάδιο του 4ου φύλου, β) στο αδέλφωμα και γ) νωρίς στο στάδιο γεμίσματος του σπόρου. Σε περίπτωση τροφοπενίας Cu απαιτείται και 4η εφαρμογή.

verno™ FG Cu + Zn

Γενικά

Το VERNO είναι ένα διαφυλλικό λίπασμα που περιέχει 30% μεταλλικό χαλκό και 30% μεταλλικό ψευδάργυρο. Προορίζεται για την αντιμετώπιση τροφοπενίων χαλκού και ψευδαργύρου.

Το VERNO περιέχει τα θρεπτικά συστατικά σε μορφή σωματιδίων οξειδίου του χαλκού και οξειδίου του ψευδαργύρου, τα οποία προσκολλώνται άριστα στα φύλλα και στην επιφάνεια του φυτού και είναι άμεσα και για μεγάλο χρονικό διάστημα διαθέσιμα στις ποσότητες που το φυτό έχει ανάγκη.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική προσκολλητική ικανότητα στη φυτική επιφάνεια.
- Άμεση διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων.
- Διασπέραιται εύκολα στο νερό.
- Είναι εύκολο στο χειρισμό (απουσία σκόνης).
- Μπορεί να αναμιχθεί σε οποιαδήποτε αναλογία με άλλα λιπάσματα για την επιθυμητή ισορροπία ψευδαργύρου και χαλκού.
- Είναι συμβατό με το μυκητοκότονο Nordox 75WG, καθώς και με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όταν το pH του ψευδαργύρου διαλύματος είναι μεγαλύτερο του 6.
- Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.
- Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα VERNO υπό συνεχή ανάδευση. Το VERNO πρέπει να διαλύεται στο νερό πριν την προσθήκη οποιουδήποτε άλλου προϊόντος.
- Συνδυαστικότητα:** Συνιστάται να εκτελέσετε δοκιμή σε μικρή έκταση πριν προχωρήσετε σε καθολική εφαρμογή.
- Φυλασσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά**

verno™ FG Cu + Zn

Διαφυλλικό λίπασμα

σε μορφή εναιωρηματοποιήσιμων κόκκων (FG) για την αντιμετώπιση τροφοπενίων χαλκού – ψευδαργύρου σε όλες τις καλλιέργειες

Αναλυτική Σύνθεση:

Μεταλλικός χαλκός (Cu) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του χαλκού
Μεταλλικός ψευδάργυρος (Zn) 30 % β/β σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ (2x500γρ.)

Παρασκευαστής σκευάσματος: NORDOX A.S., Νορβηγία



- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάσπονσης.
- Πολύ τοξικό για τους ωδόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διανομή:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@eftymiadis.gr

Ημίνια παρασκευής / Αριθμός παρτίδας: Βλέπε στη συσκευασία

verno™ FG Cu + Zn

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Μην τρώετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα. •Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. •Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβούλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 15 λεπτά. Συμβούλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αιμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Ημίνια παρασκευής: Βλέπε στην Αριθμός παρτίδας: επιφάνεια του κουτιού ΟΦΩ

