ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, βαμβάκι, ακαλλιέργητες εκτάσεις, κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: αυστηρά εντοπισμένη εφαρμογή με ψεκαστήρα χειρός ή κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύπτρα μεταξύ των γραμμών. **Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά:** καθολικός ψεκασμός. Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν φυτοτοξικότητας ή συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς. **Για την οροβάγχη στον καπνό** εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό κάλυψεως της φυτείας. Χρησιμοποιείτε μπεκ τυπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI). **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** • Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το σκεύασμα ή με το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί. • Να μην εφαρμόζεται στις άκρες χωραφιών και σε στεγνά χαντάκια. • Να μην εφαρμόζεται σε υδάτινες περιοχές ή σε εδάφη που γειτνιάζουν άμεσα με υδάτινες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των χαντακιών και των αναχωμάτων των ορυζώων. • Να μην επιτρέπεται η βόσκηση ζώων σε αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας στους οποίους έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα. • Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες από τον ψεκασμό. • Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. • Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. • Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις περιμέτρες στο έδαφος ελιές. • Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολειμματα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
- ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:
Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.
- ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φύλλα.
Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον ψεκασμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικό γάντι / προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες. • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) • Για να προστατεύετε τα φυτά μη-στόχους: - χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του βαμβακιού. - να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% για τις υπόλοιπες χρήσεις.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ–ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα. **Πληροφορίες για το γιατρό:** Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του ασθενή. Η θεραπεία με ατροπίνη και οξίμες δεν ενδείκνυται. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Roundup® 36 SL GOLD

Glyphosate (γκλυφοζέιτ), ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: glyphosate 36% β/ο
(υπό μορφή άλατος Καλίου: 44,1% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 39% β/β

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά ΥΑΑΤ:
7928 / 24-09-2009

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

- **Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**
- **Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**
- **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6166000
www.cropscience.bayer.gr

UFI: KPF1-E0Y7-K009-RH2Q

GROUP 9 HERBICIDE

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
K&NE EARTH MATTERS
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ.
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Β΄ Είσοδος, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656, **info@efthymiadis.gr**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 ΛΙΤΡΟ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟΧΟΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ημέρες) (Μ.Α.Ε/Μ.Ε): • **ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες & Οινοποιήσιμες ποικιλίες),** • **ΕΛΙΑ (Επιτραπέζιες & Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα):** Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **Δόση**: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση**: 400-600 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1-3/28. **β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)**: Κατευθυνόμενος ψεκασμός επί της γραμμής της δεντροστοιχίας όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση**: 500-800 κ.εκ./στρέμμα. **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*): **Δόση**: 800 κ.εκ./στρέμμα. **Βέλουρας** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση**: 500 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε: 1-3/28. Κύπερη** (*Cyperus* sp.): **1η** εφαρμογή κατά την άνθηση με **Δόση**: 600 κ.εκ./στρέμμα και **2η** εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με **Δόση**: 500 κ.εκ./στρέμμα **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 2. • **ΒΑΜΒΑΚΙ**: Κατευθυνόμενος ψεκασμός με καλύπτρα μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και τα φύλλωμα των φυτών. **α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα): Δόση**: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1. **β) Πολυετή ζιζάνια: Βέλουρας** (*Sorghum halepense*): **Δόση**: 500 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1. • **ΚΑΠΝΟΣ**: Οροβάγχη (*Orobanche ramosa*): Ψεκασμοί καλύψεως: α) 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με **Δόση**: 40 κ.εκ./στρέμμα και β) 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με **Δόση**: 60 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 2. • **ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ: α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)**: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **Δόση**: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση**: 400-600 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1. **β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)**: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση**: 500-600 κ.εκ./στρέμμα. **Βέλουρας** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση**: 500 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1. • **ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές): α) Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)**: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. Στην περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί να καλυφθεί το πολύ το 50% της έκτασης αυτής. **Δόση**: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. **Μολόχα** (*Malva* sp.), **Αντράκλα** (*Portulaca oleracea*), **Πολυκόμπι** (*Polygonum* spp.), **Τσουκνίδα** (*Urtica* sp.): **Δόση**: 400-600 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1-3/21. **β) Πολυετή ζιζάνια (Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα)**: Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **Δόση**: 500-1000 κ.εκ./στρέμμα. **Αγριάδα** (*Cynodon dactylon*): **Δόση**: 750-1000 κ.εκ./στρέμμα. **Βέλουρας** (*Sorghum halepense*), **Φτέρη** (*Pteridium aquilinum*): **Δόση**: 500 κ.εκ./στρέμμα. **Περικοκλάδα** (*Convolvulus arvensis*), **Κίρσιο** (*Cirsium arvense*): **Δόση**: 1000 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1-3/21. **Κύπερη** (*Cyperus* sp.): **1η** εφαρμογή κατά την άνθηση με **Δόση**: 600 κ.εκ./ στρέμμα και **2η** εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με **Δόση**: 500 κ.εκ./ στρέμμα **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 2. **γ) Ξυλώδες θάμνοι, Βάτα** (*Rubus* sp.): Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. **Δόση**: 500-1000 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1-3/21. • **ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Υδροχαρή ζιζάνια**: Κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων. **Δόση**: 800-1000 κ.εκ./στρέμμα. **Μ.Α.Ε/Μ.Ε**: 1. **ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ**: Σε όλες τις χρήσεις εφαρμόζεται με 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού / στρέμμα. Μόνο στον Καπνό, για την καταπολέμηση της Οροβάγχης, εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. **Μέγιστη δόση ανά χρήση για το σύνολο των εφαρμογών /12 μήνες: 432 γρ. glyphosate/στρέμμα.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: **1**. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. **2.** Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια *Malva* sp. (Μολόχες), *Urtica* sp. (Τσουκνίδες), *Polygonum* sp. (Πολυκόμπι), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), η δόση κυμαίνεται από 400-600 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. **3.** Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μία με δύο (1-2) εφαρμογές (χειμώνα- άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης. **4.** Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο μετά από αυτή. **5.** Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) γύρω από τα μπεκ για την αποφυγή φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες. **6.** Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτριά. **7.** Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκατοστά. **8.** Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά-Κιτριά, Γκρέιπ φρουτ, Αμυγδαλιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Ελιά, Αμπέλι: 7 ημέρες.
Βαμβάκι: Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής.
Καπνός, Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλλιέργητες εκτάσεις: --

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.