

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτική ενδυμασία/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία φόρμα και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνι ποικιμίσιο και μακρά παντελόνι».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα αναφορέσετε. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή της δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, πρέπει **φυτική ζώνη ανάσχεσης ζώνη προστασίας 10 μέτρα** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του φασολιού και του σπαραγγιού.

UFI: KQ46-80HS-5001-055F

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό και δεν επηρεάζει την βλαστικότητα των σπόρων σε καλλιέργειες για σποροπαράγωγη, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστάμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Όλες οι καλλιέργειες: Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανάκυκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



FRESCO® SC

Metobromuron 40% (Ομάδα Φαινολοουριών)

Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Metobromuron 40% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 65,46 % β/β

UFI: K8Q0-709W-7002-5CUU

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, συκώτι, νεφρά και σπλήν) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Υποπίπτει για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, διυμενείς επιπτώσεις.
- Περιέχει Metobromuron (CAS No 3060-89-7) και 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (CAS No. 2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.Stadsplateau 16,
3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ) : 70367 / 07.01.2020

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το FRESCO® είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων. Η δ.ο. μελοβρομυρον απορροφάται από τις ρίζες και δρα αναεπίθετως της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης (συγκεκριμένα την φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων στο φωτοσυνθετικό σύστημα PSII) με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Έναν (1) καθολικό ψεκασμό μετά τη συγκομιδή για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, με max δόση: 250 κ.ε. σκευάσ./στρ.

ΚΑΡΟΤΟ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ (Υπαίθρου για σποροπαράγωγη): Μία (1) εφαρμογή **προφυτρωτικά** με καθολικό ψεκασμό για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, με max δόση: 200 κ.ε. σκευάσ./στρ.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ* ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΒΟ, ΦΑΣΟΛΙΑ ΟΣΠΡΙΑ* (Υπαίθρου για σποροπαράγωγη): Μία (1) εφαρμογή **προφυτρωτικά** με καθολικό ψεκασμό για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, με max δόση: 250 κ.ε. σκευάσ./στρ.

ΚΑΠΝΟΣ* (Χρήση ήσσονος σημασίας): Έναν (1) καθολικό ψεκασμό πριν τη μεταφύτευση για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, με δόση 250-375 κ.ε. σκευάσ./στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-30 λίτρα/στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Για αυτό πρέπει να εφαρμοστεί όταν το έδαφος είναι στο ριγώο και οι ιδανικά αμέσως μετά ή πριν τη βροχή.
3. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού για εφαρμογές υπαίθρου: 30 λίτρα / στρ.
4. Μπορεί να προκληθούν διυμενείς επιπτώσεις στην έκπτυξη και στην ανάπτυξη των καλλιεργειών υπό συνθήκες στρες όπως: έλλειψη εδαφικής υγρασίας, παγετό, έντονος βροχοπτώσεις ή άρδευση σε ελαφρά έδαφη).
5. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές εισαίτητες καλλιέργειες.
6. Μετά τη συγκομιδή του σπαραγγιού, προφυτρωτικά από την καλλιέργεια και τα ζιζάνια, μετά την ισοπέδωση του εδάφους.
7. Προφυτρωτική εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά (κατά περίπτωση εντός 5 ημερών) και πριν οι κοτυληδόνες/κολετέπυλα βρεθούν κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

*Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του καπνού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Καταπολεμώμενα - ευαίσθητα ζιζάνια: *Amaranthus spp* (Βλήθα), *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ βλήθο), *Papaver rhoeas* (Παπαρούνα), *Portulaca oleracea* (Πλυστρίδα) (αποτελεσματικό από τη δόση των 250 κ.ε.).

Καταπολεμώμενα - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Chenopodium album*, *Chenopodium sp.* (Λούβουδια), *Chrysanthemum segetum* (Αγριομαργαρίτα) (αποτελεσματικό από τη δόση 250 κ.ε.), *Digitaria sanguinalis* (Μιστόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτστα).

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομόρφος ψεκασμός σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος. Εφαρμόζεται μόνο με μηχανήματα προσαρμοσμένους σε εκλυτήρια. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή με χειροκίνητους/επίπλωτους ψεκαστές. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συστηματική ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεδόντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυθίο και όλα τα εξορτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξορατιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκολληθεί: Μην χρησιμοποιήσετε για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών τις καλλιέργειες για σποροπαράγωγη στις οποίες εφαρμόσθηκε το σκεύασμα.

Σε περίπτωση που φυτεύονται ριζωματώδεις καλλιέργειες σε λιγότερο από 120 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος, μην χρησιμοποιήσετε τα εναερία μέρη των εν λόγω καλλιεργειών για ζωοτροφή.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: συνιστάται η χρήση του σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (π.χ. αμειψισπορά, μηχανική μέθοδος, κ.λ.π.), όπου αυτό είναι δυνατό. Το σκεύασμα περιέχει μελοβρομυρον, ζιζανιοκτόνο δραστική ουσία που ανήκει στην ομάδα G2 κατά HRAC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προετοιμασμένης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας όπου εφαρμόσθηκε το σκεύασμα μπορούν να σπαρθούν/φυτευθούν, πατάτα μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους ή καλαμπόκι, φασόλια, κούκι, μπιζέλια και καρότο μετά από βαθύ όρυγμα.

Δεν συνιστάται η σπορά κρομμυδιών (ελαικοκράμβη), γογγύλια και τεύτλων ως καλλιέργεια αντικατάστασης μετά από αποτυχία της καλλιέργειας όπου εφαρμόσθηκε το σκεύασμα διότι μπορεί να προκληθεί λεύκανση του φυλλώματος και απόβληση φυτών. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε χωράφι όπου εφαρμόσθηκε το σκεύασμα μπορεί να σπαρθούν/φυτευθούν, μετά από 30-45 ημέρες (4-6 εβδομάδες): καλαμπόκι, καρότο, παστινάκι, κούκι, φασόλια, πατάτα, καπνός, σπαραγγί, αγινάρα, αρωματικά φυτά και ηλιανθος. Για κρομμυδιό και ζαχαρότευπλο είναι απαραίτητο να προηγηθεί βαθύ όρυγμα πριν τη σπορά ή μεταφύτευση.

Μη φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά ή σπινάκι σε λιγότερο από 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσφασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη επιφάνεια.

Ημερ. παραγωγής: Βλέπε
επί της
Αριθμός παρτίδας: συσκευασίας



0124

bar code