

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών. Δρα παρεμποδίζοντας την καρβοξυλάση του ακετυλο-CoA (ACCCase) κατά την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων. Παράγεται χλώρωση, κοκκίνισμα των παλαιότερων φύλλων και τελικά νέκρωση των ιστών μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: - Να μην εφαρμόζεται σε κάνναβη, παπαρούνοσπορο και σε λινάροσπορο που προορίζονται για κατανάλωση από άνθρωπο ή ζώα.

- Μετά τη εφαρμογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων να μη εφαρμόζεται σκεύασμα που περιέχει fluzifor-p-butyl κατά την διάρκεια του επόμενου χρόνου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **fluzifor-p-butyl**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 1** κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες από την εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Στον αγρό με τρακτέρ ή ψεκαστήρα σύμφωνα με το φάσμα δράσης. Στο θερμοκήπιο με αυτόματο σύστημα ψεκασμού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"



FUSILADE® MAX EC



Fluzifor-p-Butyl
(χημική ομάδα: Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα)
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: fluzifor-p-butyl 12,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 86,63% β/β

UFI: 68RX-N6W6-2EAK-HPX3

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων.

• Υπόπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβryo.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Περιέχει fluzifor-p-butyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

«63,02% του μείγματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης τοξικότητας από αναπνοής.»

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70439 / 02-12-2021

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz,
Austria

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:



K&NE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός,
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:
1 λίτρο e



ΠΡΟΣΟΧΗ

Nufarm
Grow a better tomorrow

ΔΙΑΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. •«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος με γεωργικό ανελκυστήρα». •«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια». •Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξααφορέσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα, κρατήστε τον σε ηρεμία και προστατεύστε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση διαταραχής της αναπνοής εφαρμόστε τη μέθοδο της τεχνητής αναπνοής. Καλέστε αμέσως γιατρό/Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

UFI: 68RX-N6W6-2EAK-HPX3

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε επιφάνεια μεγαλύτερη από:

• το **30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού**, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, των ακρόδρυων, των πυρηνόκαρπων, των μηλοειδών, της σικιάς, της ελιάς, των δασικών ειδών, της ακτινιδιάς, των καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων.

• το **50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού**, στις καλλιέργειες του αμπελιού, των μούρων και μικρών φρούτων.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας:

• για την δόσολογία 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα: μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 75%**,

• για την δόσολογία ίση ή μεγαλύτερη από 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα: αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσιών μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 50%** ή χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 90%**.

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε φιάλη



0625



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ, Κουμκουάτ, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Κουκουναριά, Μακαντάμια, Πεκάν, Κάσιους, Καρύδια Βραζιλίας, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνία, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Συκιά, Ακτινίδια, Ελιές : Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλια (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα), Σμέουρα, Βατόμουρα: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, όταν έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Φρούλες (Α): Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Αγγούρια (Α) , Αγγουράκια (Α), Κολοκύθια(Α), Καρότο (Α), Κοκκινόγouλία, Ραπανοσέλινο/Γογγύλι (ρεβ) (Α), Χρένα (Α), Παστινάκι η εδώδιμη (Α), Ραπάνια/Ραφανίδες, Λαγόχορτο, Γουλιά, Γογγύλι, Μαρούλι (Α), Ρόκα (Α), Κάρδαμο (Α), Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες, Σπανάκι (Α), Ανδράκλα (Α), Σέσκουλα (Α), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-250 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Μυρώνια, Σχοινόπρασο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασκόμηλο, Δεντρολίβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Δάφνη, Εστραγκόν ή δρακόντειο: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-250 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Σπαράγγι (Α): Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Αγκινάρα: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Φασόλια (Α) (με λοβό), Μπιζέλια (Α) (με λοβό), Μπιζέλια (Α) (χωρίς λοβό): Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθιση. Δόση: 100-250 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40

λίτρα/στρέμμα.

Φασόλια (Ξερά), Μπιζέλια (Ξερά), Φακές: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. Δόση: 100-250 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Λούπινο, Λιναρόσπορος/ Λινάρι, Παπαρουνόσπορος: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Φυτώρια (Α): Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία. Δόση: 300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Φυτώρια Βιομηχανικής Κάνναβης: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Ελαιοκράμβη: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος κάθε δύο (2) χρόνια, πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Πατάτα: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος κάθε δύο (2) χρόνια, πριν την ανθοφορία, σχηματισμό κονδύλων και το κλείσιμο των γραμμών. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Ηλιάνθος: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν σχηματιστούν 6 ζεύγη φύλλων. Δόση: 100-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Σόγια: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Καπνός: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος πριν την ανθοφορία της καλλιέργειας. Δόση: 100 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Καλλωπιστικά(θερμοκηπίου): Βιόλα ή Βιολέτα, Γαρυφαλλιά, Ζέρμπερα, Κρίνος, Πετούνια, Πριμούλα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμα: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος μόνο με αυτόματο σύστημα, όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 150-300 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Για αγρωστώδη ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Βαμβάκι: Για αγρωστώδη ετήσια ζιζάνια. Ένας (1) ψεκασμός φυλλώματος όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια έχουν τουλάχιστον δύο αναπτυγμένα φύλλα και πριν το στάδιο του πλήρους αδερφώματος. Δόση: 100-250 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Το προϊόν να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια έχουν τουλάχιστον 2 πραγματικά φύλλα (BBCH12) έως το στάδιο του αδερφώματος (BBCH 29)

2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες των

καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

3. Ειδικά για την καταπολέμηση των πολυετών ζιζανίων να χρησιμοποιούνται οι μεγαλύτερες εγκεκριμένες δόσεις.

4. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βροχή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.

5. Να μην συγκομίζετε φρούτα από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

6. Για τις ελιές επιτρέπεται η συγκομιδή τους μόνο από το δέντρο και όχι από το έδαφος.

7. Η χρήση στα φύλλα σέλινου περιλαμβάνει και το λάπαθο.

8. Η χρήση στη ρίζα μαιντανού περιλαμβάνει και τις ρίζες ανγγελικής και ρίζες λεβοντικού.

9. Η χρήση στο χρένο περιλαμβάνει και τις ρίζες γεντιανής.

10. Η χρήση στα φασόλια με λοβό περιλαμβάνει και τα κουκιά.

11. Η χρήση στα μπιζέλια με λοβό περιλαμβάνει και τα ρεβύθια.

12. **Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ετήσια ζιζάνια:** Αλεπουούρα (*Alopecurus sp.*), Αγριοβρώμη (*Avena sp.*), Βρώμος (*Bromus sp.*), Κριθάρι (*Hordeum vulgare*), Σιτάρι (*Triticum aestivum*), Αιματοχορτο (*Digitaria sp.*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Σετάρια (*Setaria sp.*)

Ευαίσθητα πολυετή ζιζάνια: Ηρα (*Lolium rigidum, Lolium sp.*), Αγριάδα (*Agrropyron repens, Cynodon dactylon*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ηλιάνθος, Κουκιά, Ρεβίθια, Φασόλια Ξερά, Μπιζέλια (Ξερά), Φακή Ξερή, Λούπινο, Πατάτα, Ελαιοκράμβη, Λιναρόσπορος/Λινάρι, Παπαρουνόσπορος, Βαμβάκι: **90 ημέρες**

Σόγια: **75 ημέρες**

Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα: **56 ημέρες**

Σμέουρα, Βατόμουρα: **45 ημέρες**

Μαρούλι, Ρόκα, Κάρδαμο, Λυκοτρίβολο, Σπανάκι, Ανδράκλα, Σέσκουλα, Σκαρόλες, Μυρώνια, Σχοινόπρασο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασκόμηλο, Δεντρολίβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Δάφνη, Εστραγκόν ή δρακόντειο, Αγκινάρα, Φράουλα: **42 ημέρες**

Μπιζέλια χωρίς λοβό: **35 ημέρες**

Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κλημεντίνη, Κουμκουάτ, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνία, Κερασιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Ελιά, Συκιά, Αμπέλι (για οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια), Ακτινιδιά, Σπαράγγι, Κρεμμύδια, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Αγγούρι(Α), Αγγουράκι(Α), Κολοκύθι, Φασόλια με λοβό, Μπιζέλια με λοβό, Καρότο, Κοκκινόγouλία, Ραπανοσέλινο/Γογγύλι (ρεβ), Χρένα, Παστινάκι η εδώδιμη, Ραπάνια/Ραφανίδες, Λαγόχορτο, Γουλιά, Γογγύλι: **28 ημέρες**

Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Κουκουναριά, Κάσιους, Μακαντάμια, Πεκάν, Καρύδια Βραζιλίας: **21 ημέρες**

Φυτώρια, Φυτώρια βιομηχανική κάνναβης, Καπνός, Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Βιόλα, Γαρυφαλλιά Ζέρμπερα, Κρίνος, Πετούνια, Πριμούλα, Τριανταφυλλιά, Χρυσάνθεμα), Ακαλλιέργητες εκτάσεις: **Δεν ορίζεται**