

3

ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
για μέγιστα αποτελέσματα

το σωστό στάδιο ζιζανίων

Είναι σημαντικό να **ψεκάσουμε** στο κατάλληλο στάδιο ζιζανίων. Αυτό είναι: χωρίς για τα **ετήσια** όταν έχουν ύψος 10-20 εκ. και κοντά στην άνθηση για τα **πολυετή**.

η σωστή δόση

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε δόσεις μεγαλύτερες από αυτές της ετικέτας. **Η σωστή δόση είναι αρκετή** για την άριστη καταπολέμηση των ζιζανίων.

ο σωστός όγκος νερού

Για το Ράουνταπ® Γκολντ, **αρκούν 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα** για άριστα αποτελέσματα. **Μεγαλύτεροι όγκοι νερού οδηγούν σε μειωμένη αποτελεσματικότητα.**



Ράουνταπ® Γκολντ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

1. Μάθετε για το σωστό στάδιο εφαρμογής

Συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας.

Αυτός θα σας συστήσει πότε να ψεκάσετε στο σωστό στάδιο με την κατάλληλη δόση.

2. Μάθετε τη σωστή δόση

Για τις καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μπλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Ελιά

Για αγρούς: μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά

Για ακαλλιέργητες εκτάσεις

Ετήσια ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα)	150-200 κ.εκ./στρ.
Μολόχα, τσουκνίδα, αντράκλα, πολυκόμμι	400-600 κ.εκ./στρ.
Μέχρι 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο όταν βρίσκονται στα στάδια της ζωηρής ανάπτυξης τους	
Πολυετή ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα). Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο όταν βρίσκονται κοντά στην άνθηση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή	500-1000 κ.εκ./στρ.
Αγριάδα	750-1000 κ.εκ./στρ.
Βέλιουρας, Φτέρη	500 κ.εκ./στρ.
Περικοκλάδα, Κίρσιο	1000 κ.εκ./στρ.
Κύπερη (2 εφαρμογές): 1η εφαρμογή: κατά την άνθιση	600 κ.εκ./στρ.
2η εφαρμογή: σε περίπτωση αναβλάστησης	500 κ.εκ./στρ.
Βαμβάκι: Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών της καλλιέργειας πριν την άνθισή της	
Ετήσια ζιζάνια (αγρωσώδη & πλατύφυλλα). Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο	150-200 κ.εκ./στρ.
Πολυετή ζιζάνια (βέλιουρας). Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο	500 κ.εκ./στρ.
Καννός: 2 εφαρμογές για την καταπολέμηση της οροβάγχης με καθολικό ψεκασμό της καλλιέργειας.	
1η εφαρμογή: 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	40 κ.εκ./στρ.
2η εφαρμογή: 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση	60 κ.εκ./στρ.
Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών. Υδροχαρή ζιζάνια: Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο όταν βρίσκονται κοντά στην άνθηση ή κατά την άνθηση. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.	800 - 1000 κ.εκ./στρ.

3. Μειώστε τον όγκο νερού

Για να μειώσετε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού στα 20-40 λίτρα στο στρέμμα:

A. Αν ψεκάζετε με κοινή μάνικα, μειώστε την πίεση στις 3 – 4 ατμόσφαιρες σε συνδυασμό:

1. Με κατάλληλο μπέκ, ή
2. Χρησιμοποιείστε μικρότερη βελόνα, ή

B. Χρησιμοποιείστε τις προτεινόμενες μάνικες ψεκασμού ΡΑΟΥΝΤΑΠ® ΓΚΟΛΝΤ



Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ. & Τροφ.: 7928/24.2.2010

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Μονασάντο Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε.
Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα 11528,
Τηλ: 210 725 9435, Fax: 210 725 9439