

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα, κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για μάτια / πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις καλλιέργειες της πατάτας, του αμπελιού, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, των ακρόδρυων, της ελιάς, της ακτινιδιάς και της τομάτας να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 15 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις καλλιέργειες της αγκινάρας και της μπανάνας να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους στις καλλιέργειες της πατάτας, της τομάτας, του αμπελιού, των μηλοειδών, των πυρηνοκάρπων, των ακρόδρυων, της ελιάς και της ακτινιδιάς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 30% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους στις καλλιέργειες της αγκινάρας και της μπανάνας να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

UFI: 0AN4-20HQ-T001-TU94



Pyraflufen-ethyl

(Χημική ομάδα Phenylpyrazole)

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: pyraflufen-ethyl 1,06 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 98,84 % β/β

UFI: 0AN4-20HQ-T001-TU94

Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει *Benzensulfonic acid*, *C10-13-alkyl derives*, *άλατα ασβεστίου* και *2-Methyl-1-propanol*.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας:

Nichino Europe Co Limited



5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge, Cambridge shire,

Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M.ABEE, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@euthymiadis.gr

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70477 / 23-12-2022

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Χρησιμοποιείται στην πατάτα για αποξήρανση των στελεχών πριν τη συγκομιδή και για τον έλεγχο των παραφυάδων σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Η δραστική ουσία pyraflufen-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου (protoporphyrinogen oxidase - PPO), παρεμποδίζοντας τους φωτοσυνθετικούς διαύλους του φυτού. Συνεπώς η δράση του βελτιώνεται με συνθήκες έντονου ηλιακού φωτισμού.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyraflufen-ethyl που ανήκει στην ομάδα 14 κατά HRAC. • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):

Αμπέλι: 60 ημέρες

Μηλιά, Αχλαδιά-Ασιατική Αχλαδιά, Κιδογόνι, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Βερικακιά, Κερασιά-Βυσινιά: 30 ημέρες

Τομάτα (για εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση): 28 ημέρες

Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά: 21 ημέρες

Μπανάνες: 15 ημέρες

Πατάτα: 14 ημέρες

Ακτινιδιά, Ελιά: 7 ημέρες.

Αγκινάρα, Τομάτα (για εφαρμογή πριν τη μεταφύτευση): -

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"

ΗΜΕΡΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΤΑΤΑ: α) Για την **Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές κατά την έναρξη κηρηνίσματος των φύλλων (Μάρτιος-Οκτώβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 5 ημέρες. β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με δόση 100-200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή προφυτευτική ή νωρίς μεταφύτευτικά, μέχρι την εμφάνιση του 5% των φυτών (Μάρτιος-Οκτώβριος).

ΑΜΠΕΛΙ: α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από την πλήρη έκπτυξη 9 ή περισσότερων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού (Απρίλιος-Αύγουστος). β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού (Φεβρουάριος-Αύγουστος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσυμουλιά, Ισπανική Μουσυμουλιά, Ασιατικό Αχλάδι (nashi, αχλαδόμηλο): α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τη διόγκωση των ανθοφόρων σφαιλίων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Μάρτιος-Σεπτέμβριος). β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά): α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τη διόγκωση των ανθοφόρων σφαιλίων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Μάρτιος-Αύγουστος). β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Αύγουστος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά): α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος). β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση

προστατευτικών καλυπτρών, από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση) (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος). β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από τον λήθαργο μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση) (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες (15 ημέρες για αποξήρανση παραφυάδων).

ΕΛΙΑ (Επιτραπέζιες και Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): α) Για την **Αποξήρανση παραφυάδων**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα/στρέμμα και β) Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-40 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκάσμο με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος της ποικιλίας μέχρι τον έντονο μεταχρωματισμό των καρπών (Απρίλιος-Σεπτέμβριος). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές ανά 20 ημέρες.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 87,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 25-40 λίτρα/στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκάσμος με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου (Ιούλιος-Οκτώβριος).

ΜΠΑΝΑΝΑ: Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με μέγιστη δόση 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκάσμος ανά έτος με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, νωρίς μεταφύτευτικά (Ιανουάριος-Δεκέμβριος).

ΤΟΜΑΤΑ (Υ): Για **Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια**, με δόση 100-200 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μία (1) εφαρμογή ανά έτος με καθολικό ψεκάσμο πριν τη μεταφύτευση (μέχρι 1 μέρα πριν) (Μάρτιος-Ιούνιος) ή με κατευθυνόμενο ψεκάσμο μεταξύ των γραμμών φύτευσης με χρήση προστατευτικών καλυπτρών, μετά τη μεταφύτευση από την έκπτυξη του 5^{ου} φύλλου μέχρι το σχηματισμό της 2^{ης} ταξικαρίας (Απρίλιος-Αύγουστος).

* Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών στην καλλιέργεια της πατάτας είναι **δύο (2):** 1 εφαρμογή για καταπολέμηση ζιζανίων + 1 εφαρμογή για αποξήρανση στελεχών ή 2 εφαρμογές για αποξήρανση στελεχών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει και το ασιατικό αχλάδι (nashi, αχλαδόμηλο).
3. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει και τη βυσσινιά.
4. Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων να γίνεται σε **μη φυλλοπτινόμενες παραφυάδες με μήκος έως 15-20 εκ.**
5. Εφαρμογή απουσία ανέμου.
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες ελιάς Κалаμών και Κορωνέικη, στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανιά και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

• Πατάτα

Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*) Πολυκόμτι (*Polygonum aviculare*), Πολύγωνο αναρριχόμενο (*Fallopia convolvulus*).

Μερίως ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa / Polygonum persicaria*), Περιπλοκάδα

(*Convolvulus arvensis*).

• Τομάτα

Ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa / Polygonum persicaria*), Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Πολυκόμτι (*Polygonum aviculare*), Πολύγωνο αναρριχόμενο (*Fallopia convolvulus*).

• Αγκινάρα

Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βλήτο άσπρο (*Amaranthus albus*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μολόχα (*Malva spp.*), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*), Σίσυμβριο (*Sisymbrium irio*), Τσουκνίδα μικρή (*Urtica urens*), *Chenopodium murale*, *Diplotaxis virgata*.

• Αμπέλι, Μηλόειδη, Πυρηνοκάρπα, Ακρόδρυα, Ακτινίδιο, Ελιά

Ευαίσθητα: Αγριόμαρουλο (*Lactuca serriola*), Αναγαλιίδα (*Anagallis arvensis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βερνίκια (*Veronica hederifolia*, *Veronica persica*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Γεράνι (*Geranium dissectum*), Επιλόβιο (*Epilobium spp.*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Καρδαμίνη (*Cardamine hirsuta*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κόνυζα (*Erigeron bonariensis*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Μολόχα (*Malva sylvestris*), Μύσαρο (*Myragrum perfoliatum*), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas*), Πολυκόμτι (*Polygonum aviculare*), Σκαρολάανο (*Mercurialis annua*), Στελλάριο (*Stellaria media*), Τορίλιδα (*Torilis arvensis*), *Acalypha virginica*, *Chamaesyce prostrata / Euphorbia prostrata*, *Diplotaxis erucoides*.

Μερίως ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*), Κόνυζα (*Erigeron canadensis*).

• Μπανάνα

Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*), Βλήτο καλλιεργούμενο (*Amaranthus hybridus*) Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis*), Κόνυζα (*Erigeron canadensis*), Λαβιτέρα (*Lavatera arborea*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*).

Τρόπος εφαρμογής: Αποξήρανση στελεχών πατάτας: καθολικός ψεκάσμος φυλλώματος. Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα πριν τη μεταφύτευση: καθολικός ψεκάσμος. Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα μετά τη μεταφύτευση: κατευθυνόμενος ψεκάσμος μεταξύ των γραμμών φύτευσης με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Αντιμετώπιση ζιζανίων και αποξήρανση παραφυάδων στις υπόλοιπες καλλιέργειες: κατευθυνόμενος ψεκάσμος με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Εφαρμογές χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακροφύσια μείωσης χαμηλής πίεσης με μέγιστες ταχύτητες 5-6 χλμ./ώρα και με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 2 bar.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά τα 2/3. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο υπό συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά και με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.