

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εάν έχετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα. •Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. •Μην αναπνέετε αέρια/υπερκεντρώσις σταγονιδίων/ ενκεντρώματα. •Πλύνετε τα χέρια και πρόστιο οολοαοκάκι μετά το χέρισμό. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδυμασιακά στοιχεία προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Τα μαλλιά είναι ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βυθίζονται στο χώρο εργασίας. •Απόφυγετε περιγεγομυμένα/πυρετικά σύννευμα με εθνική νομοθεσία. •Φοράτε ολοσώμια φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση, και ολοσώμια φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περιπτώσεις πυκνής φύσεως φοράτε ολοσώμια φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια, και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και αδιαβρόχη ολοσώμια φόρμα και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. •Σε περίπτωση επανεξόδου στην ψεκασιμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο. •Επιτρέπεται η επανεξόδου στην ψεκασιμένη περιοχή μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών για την καλλιέργεια της λεμονιάς/φορνιάς ολοσώμια φόρμα εργασίας και γάντια. •Στην καλλιέργεια της λεμονιάς, δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκασιτών χυμών χείρας ή επιτύπιο ψεκασιτήρα. •Για την προστασία των κατοικιών ή των περιουσιακών, χρησιμοποιείτε στην καλλιέργεια της λεμονιάς ακροφύσια μείωσης της διαποράς του ψεκασιτού νέφους κατά 50%.

ΜΗ ΨΥΛΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύγετε ή ριπάνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρώτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε:
- Για τις καλλιέργειες της **Πορτοκαλιάς Νεραντζιάς, Περγαμόντα και Μανταρινιάς (με δόση: 300 κ.εκ./στρ).**
Μια αψεκαστή ζώνη προστασίας: **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 30% ή **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 75% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 95% ή τρέψτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **25 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

- Για τις καλλιέργειες **Πορτοκαλιάς, Νεραντζιάς, Περγαμόντα και Μανταρινιάς (με δόση έως 200 κ.εκ./στρ).**
Μια αψεκαστή ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 70% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 90% ή τρέψτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

- Για τη καλλιέργεια της **Λεμονιάς.**
Μια αψεκαστή ζώνη προστασίας: **25 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα ή **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 50% ή **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 75%.

- Για τις καλλιέργειες της **Μηλιάς, Αχλαδιάς, Ιαπωνικής Αχλαδιάς - Nashi, Κιυώνιας, Μουσαουλιάς, Ροδικινιάς, Φουντουκιάς και των Καλλωπιστικών Ύψους άνω των 50 εκ.**

- Για τις καλλιέργειες **Πορτοκαλιάς, Νεραντζιάς, Περγαμόντα και Μανταρινιάς (με δόση έως 200 κ.εκ./στρ).**
Μια αψεκαστή ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 70% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διαποράς κατά 90% ή τρέψτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

- Σε περίπτωση εφαρμογής σε υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος κάτω των 50 εκ. τρέψτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **15 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Επιπρόσθετα για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυσης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζώων. Απομακρύνετε ή άλλα καταστρέψτε τα ζώα πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

-Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Γενικά: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε έναν αισθανθείσα αίσθησθαι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Μην προκαλέσει εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος, ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση έκθεσης στα μάτια: Μετακινήστε το πάβλο στην καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διασφαλίζει την αναπνοή. Χρησιμοποιήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Αν να συμπτωματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό με αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UF1: UR4P-M33P-4MAM-WNRG
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με καθαρό νερό. Το καθαρό νερό γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκασιτό νερό) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενης με πρόηψη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείστε σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωσης ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φωτοτοξικότητας: Δεν είναι φωτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Σε καλλωπιστικά λανθοκομικά φυτά και στις τοπικές αχλαδιάς Κρούσταλι και Κοντούλα συνιστάται δοκιμή φωτοτοξικότητας μικρής έκτασης.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία (σε θερμοκρασία έως 40°C).

Αριθμ. Παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας
Ημερία παραγωγής:



KANEMITE SC

Acequinoctyl (χημική ομάδα: παράγωγο ναφθοκινόνης) Συμπτωκωμένο αιώρημα (SC)

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acequinoctyl: 16,4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 83,91% β/β

UF1: UR4P-M33P-4MAM-WNRG

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες (από εισπνοή).
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αιμοποιητικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει acequinoctyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Παρασκευαστής σκευάσματος:
Agrā-Kanesho CO. LTD., 7F Akasaka Shasta-East, 4-2-19, Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Ιαπωνία

Κάτοχος της άδειας:
K&N ΕΥΡΩΜΕΔΙΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 2203/28-05-2019



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το acequinoctyl είναι ένα ακαρεοκτόνο με δράση, κυρίως μέσω επαφής και δευτερευόντως μέσω κατάποσης, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων και στα υλ. Δρα στα μιτοχόνδρια (αμιπλακτο III), με παρεμπόδιση της μεταφοράς ηλεκτρονίων.

ΘΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΑ-NASHI για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 120-180 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοχή έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 120-300 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνησης, φύσκωμα οφθαλμών). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 120-180 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοχή έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή max. 150 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθριος & Θερμοκηπιώτης) για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 100-120 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνησης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΑΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΚΟΥΔΙ (Υπαίθριος & Θερμοκηπιώτης) και ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΚΟΥΔΑ (Υπαίθριος) για Κίτρινο τetrάνυχο στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 100-120 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνησης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ και ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΥΘ) για Κίτρινο και Κόκκινο τetrάνυχο στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκασιτού ή 100-120 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα. Όγκος ψεκασιτικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασιμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις: 1. Το KANEMITE έχει δευτερογενή δράση για την ανιμετώπιση των ακάρεων: *Phytonemus sp., Eriophyes sp.* στις εγκεκριμένες καλλιέργειες. 2. Συνιστάται η έμφαση στην έναρξη της προσβολής, με όγκο νερού που διασφαλίζει ομοιόμορφη και κοπή διάβρωση του φυλλώματος. 3. Σε περίπτωση καθυστέρησης εφαρμογής όπου παρουσιάζονται υψηλά πληθυσμιακά επίπεδα, προτιμάται η χρήση, συνιστάται ψεκασιμός με εγκεκριμένο ωκεάνιο ακαρεοκτόνο σκεύασμα που συμπεριλαμβάνει τη δράση 4. Η χρήση στο αγούρι, αγγούρι, κολοκύθα, πεπόνι, καρπούδι και κολοκύθα υπαίθριου, περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ. 5. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά και το περγαμόντο. 6. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει το κίτρο/κίτρινο. 7. Η χρήση στη Ροδικινιά περιλαμβάνει τη Νεκταρινιά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιμό φυλλώματος. Στην καλλιέργεια της λεμονιάς το σκεύασμα να εφαρμόζεται μόνο με μηχανοκίνητη μέσα.

Τρόπος παρασκευής ψεκασιτικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκασιτικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίχνουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο δοχείο του ψεκασιτικού μηχανήματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώσουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκασιτικού μηχανήματος: Αδειάστε τελείως το ψεκασιτικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκασιτικού μέχρι να ελευθερωθούν πλήρως από τα υλικά προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία acequinoctyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 20 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

-Να γίνεται χρήση καλλιερητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.

-Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και σε αναλογία με ακαρεοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.

-Να εξασφαλιστεί καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φυλλών με το ψεκασιτικό υγρό.

-Να πληρωθούν συστηματικώς έλεγχοι των πληθυσμών των εξθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

-Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής με την πρόσβαση του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκασιτικό υγρό. Στην καλλιέργεια της λεμονιάς επανεξόδου σε τεσσάρων (4) ημέρες μετά την ψεκασιμό με χρήση γαντιών και ολοσώμια προστατευτικά ενδυμασιακά.

ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ:
• Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιυώνια, Μουσαουλιά, Ιαπωνική Αχλαδιά - Nashi), Ροδικινιά, Νεκταρινιά: 30 ημέρες.
• Πορτοκαλιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Μανταρινιά, Λεμονιά, Κίτρο/κίτρινο: 28 ημέρες.
• Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα (Υ & Θ), Πεπόνι, Καρπούδι, Κολοκύθα (Υ): 3 ημέρες.
• Φουντουκιά: 21 ημέρες.



0625

5 200252 690607 >