

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσετε κλειδωμένα. •Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη των προϊόντων ή την ετικέτα. •Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. •Μην αναπνέετε αέρια/αυαποεκκρίσεις στενοχωριών/ενεργημάτων. •Πλύνετε τα χέρια και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδυμασία/μέσα αποτικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. •Διαβάστε περιεχόμενο/περίεκτη σύμφωνα με εθνική νομοθεσία. •Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια και μέσα αποτικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση, και ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περιπτώσεις τυκνής φύτρευσης φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, προστατευτικά γάντια, και μέσα αποτικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση και αδιόβροχη ολόσωμη φόρμα και προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεξόδου στην γεωμετρική περιοχή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακριμάνικο πουκάμισο".

•**Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**
(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρίνες επιφανείας και τους δρόμους).

• **Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε:** •Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών (με δόση: 300 κ.εκ./στρ.) μια αψέκαστη ζώνη προστασίας: **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 30% ή **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 95% ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **25 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα.

•Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών (με δόση έως 200 κ.εκ./στρ.) μια αψέκαστη ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 70% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα. •Για τις καλλιέργειες των Μελιόειδων, των Πυρηνόειδων, της Φουντουκιάς και των Καλλιμασιτικών ύψους άνω των 50 εκ. μια αψέκαστη ζώνη προστασίας: **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 70% ή **3 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα. • Σε περίπτωση εφαρμογής σε υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος κάτω των 50 εκ. τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **15 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

•**Επιπικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνους μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

•**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Γενικά: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UF1: UR4P-M33P-4MAM-WNRG

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται από πίσω με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκατικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενταπιόνονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστάμενες δόσεις εφαρμογής. Σε καλλιμασιτικά (λάνθοκαμια φυτά και στις ποικιλίες αχλαδίας Κρυσταλί και Κοντούλα συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας μικρής έκτασης.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία (σε θερμοκρασία έως 40°C).

Αριθμ. Παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας
Ημερίνα παραγωγής:



KANEMITE SC

Acequinocyl
(χημική ομάδα: παράγωγο ναφθοκινόνης)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Acequinocyl: 16,4% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 83,91% β/β

UF1: UR4P-M33P-4MAM-WNRG

KINΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

• Προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες (από εισπνοή).

• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αιμοποιητικό σύστημα

ώστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Περιέχει acequinocyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agra-Kanesho CO. LTD., 7F Akasaka Shasta-East, 4-2-19, Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Ιαπωνία

Κάτοχος της άδειας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@ethymidiads.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΑΑ): 2203/28-05-2019

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το acequinocyl είναι ένα ακαρεοκτόνο με δράση, κυρίως μέσω επαφής και δευτερευόντως μέσω κατάποσης, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων και στα αυτ. Δρα στα μιοχονδρία (σύνπλοκο III), με παρεμπόδιση της μεταφοράς ηλεκτρονίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΑ-NASHI για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-180 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοιξή έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-300 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοιξή έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-180 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Ανοιξή έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή max. 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθριο & Θερμοκηπίου) για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 100-120 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-16 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΑΓΟΥΡΙ, ΑΓΟΥΡΙΚΗ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθριο & Θερμοκηπίου) και **ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΣΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υπαίθριο)** για Κίτρινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 100-120 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ και ΚΑΛΑΔΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ.Θ) για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 100-120 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκατικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

1. Το KANEMITE έχει δευτερογενή δράση για την αντιμετώπιση των ακάρεων: *Phytonemus sp.*, *Eriophyes sp.* στις εγκεκριμένες καλλιέργειες.

2. Συνιστάται η επέμβαση στην έναρξη της προσβολής, με όγκο νερού που διασφαλίζει ομοιόμορφη και καλή διαβροχή του φυλλώματος.

3. Σε περίπτωση καθυστερημένης εφαρμογής όπου παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί σε ενήλικα, προνύμφες και αυτά ακάρεων, συνιστάται ψεκασμός με εγκεκριμένο ωκοντό ακαρεοκτόνο σκεύασμα που συμπληρώνει τη δράση.

4. Η χρήση στο αγουρί, αγουρίκι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι και κολοκύθα υπαίθρου, περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάρι φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκατικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκατικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίχνουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο δοχείο του ψεκατικού μηχανήματος αναδύμε συνεχώς. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Καθαρισμός ψεκατήρα: Συνιστάται ξεπλύμα με άφθονο νερό.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία acequinocyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 20 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:
-Να γίνεται χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.

-Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.

-Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφανείας των φυλλών με το ψεκατικό υγρό.
-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των γεωγράφων/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

-Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκατικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΛΗ:
• Μελιόκη (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μούσμουλα, Ιαπωνική Αχλαδιά – Nashi), Ροδάκινια: 30 ημέρες.
• Πορτοκάλια, Μανταρίνια: 28 ημέρες.
• Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγουρί, Αγουρίκι, Κολοκύθι (Υ & Θ), Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ): 3 ημέρες.
• Φουντουκιά: 21 ημέρες.



5 20252 690607 >



1024