

KYLEO®

The weed twister



Πυκνό διάλυμα (SL)

Glyphosate οξύ 24% (χημική ομάδα φωσφονογλυκινών)
2,4-D οξύ 16% (χημική ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία 1: Glyphosate οξύ 24% β/ο (σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 32,4% β/ο)
Δραστική ουσία 2: 2,4-D οξύ: 16% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 65,52% β/β

UFI: QJPW-X8XP-TFAG-P8XJ

Διασυστηματικό μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών καθώς και την καταπολέμηση των παραφυάδων.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακάσιμο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνεύετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια κατά το χειρισμό και εφαρμογή του προϊόντος» «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και γυαλιά κατά την αναμίξη/φόρτωση του προϊόντος» «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε μακριά παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα, ζωνταριά ή τη χρήση γαντιών» Για την προστασία των περιοχών που πρέπει για απόσταση 10 μέτρων από κατοικημένες περιοχές με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίου μείωσης της διασποράς κατά 50%.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωστρωτές επιφάνειες και τους δρομους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα: - **10 μέτρων** για εφαρμογή σε αγρούς μετά τη συγκομιδή, για καταστροφή της καλαμιάς και για κατεργασία του εδάφους για απόρριψη. - **5 μέτρων** για εφαρμογή σε καλλιέργεια ελιάς και εσπεριδοειδών.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν: - αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά **75%**, για εφαρμογές σε ελιά και εσπεριδοειδή και για τη μέγιστη δόση 400- 500 κ.εκ./στρ στις λοιπές εφαρμογές. Για την εφαρμογή στην ελιά για την καταπολέμηση των λαίμαργων δεν απαιτούνται μέτρα προστασίας για τα φυτά μη στόχους. - αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη γεωργική γη ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά **50%**, για τη δόση 300 κ.εκ./στρ στις λοιπές εφαρμογές πλην ελιάς/εσπεριδοειδών.

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔ): 70058/25-11-2013

Κάτοχος της άδειας/Παρασκευαστής:
Nufarm GmbH & Co. KG,
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας /
Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.-Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόα.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

1123

Περιεχόμενο:
5 λίτρα e

Nufarm
Grow a better tomorrow

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το KYLEO ® απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφυρούς βλαστούς των ζιζανίων. Το Glyphosate παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το 2,4-D μετακινείται στους νεαρούς μερισιωματικούς ιστούς, επηρεάζοντας την αναπνοή, τα αποθέματα θρεπτικών συστατικών και την κυτταρική διαίρεση.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ομοιόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 20 – 40 λίτρα ψεκαστικό υγρό / στρέμμα ή κατευθυνόμενος εντοπισμένος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή κάτω από την κόμη των δέντρων. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην έρθουν σε επαφή με το φύλλωμα, με τους καρπούς ή με γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2atm (30 PSI) ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: **Στάδιο ζιζανίων:** Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κατά το στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κοντά στην ανθοή, κατά ή λίγο μετά από αυτή. Τα υδροχαρή ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κοντά ή κατά την ανθοή τους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Ελιές, Εσπεριδοειδή: 30 ημέρες
Λοιπά πεδία εφαρμογής: Μη εφαρμογίσιμο

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης της προσατευόμενης καλλιέργειας:** Σιτηρά: 7 ημέρες, Μηδική και Μαύρο Σιτάρι: 30 ημέρες.

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Αραβόσιτος: 15 ημέρες, Φασόλια και Μπιζέλια: 30 ημέρες, Πατάτες, Ζαχαρότευτλα και Ηλιανθος: 60 ημέρες.

Να μην εφαρμόζεται πριν τη σπορά ελαιοκράμβης, και λαχανικών, εκτός αν η εφαρμογή πραγματοποιείται το φθινόπωρο της προηγούμενης χρονιάς. Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και την κατεργασία του εδάφους για σπορά, να μεσοβάλλει διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκληρό ή ακαθάρτο νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται η ανάμειξη του KYLEO ® με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενική συμβουλή: Εφόσον υπάρχουν συμπτώματα ή εφόσον υπάρχει αμφιβολία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: QJPW-X8XP-FTAG-B8XJ

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πάνε στο νερό.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες: i. glyphosate, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 9(G) κατά HRAC και ii. 2,4-D, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 4(O) κατά HRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το στην αρχική του παραβίαση συσκευασία, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από -5°C μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί
Αριθμός παρτίδας: της συσκευασίας

MEAS TOY



ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Άγροι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας/ Καταστροφή της καλλιέργειας/ **Άγροι** πριν την κατεργασία του εδάφους για ποτά σιτηρών, μηδικής, σόγιας: α) Ετήσια(1) ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα): Μια(1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κατά το στάδιο της ζωήρας τους ανάπτυξης με δόση 200-300 κ.εκ./στρέμμα και β) Πολυετή(**): Μια(1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται, κοντά στην άνθηση, κατά ή λίγο μετά από αυτή με δόση 400-500 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Ακαλλήνευστες εκτάσεις: Βιομηχανικά και Αστικά Πάρκα / Δρόμοι αστικών πάρκων / Κατά μήκος οδोπροδρομικών γραμμών: Μια(1) εφαρμογή για ετήσια(1) και πολυετή(**) ζιζάνια με δόση 400-500 κ.εκ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/ στρ.

Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών: Υδροχαρή ζιζάνια: Μια(1) εφαρμογή κοντά ή κατά την άνθηση των ζιζανίων με δόση 400-500 κ.εκ. σκευάσ. /στρ. και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/ στρ.

Ελιές (Επιπραστέες και ελαιοποιήσιμες): Για τηγία και πολυετή ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα): Δύο εφαρμογές με κατευθυνόμενο ομοιόμορφο ή κατευθυνόμενο εντοπισμένο ψεκασμό από την ανάπτυξη των πρώτων φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών (Απρ.-Νοεμ.) με δόση 340-450 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Η 1^η εφαρμογή την άνοιξη-καλοκαίρι (Απρ.-Ιουλίου) και η 2^η εφαρμογή το φθινόπωρο. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ ανειστικής-καλοκαιρινής και φθινοπωρινής εφαρμογής.

Ελιές (Επιπραστέες και ελαιοποιήσιμες): Για την καταπολέμηση των παραφύων (λαίμαργων δαστών): Μια(1) εφαρμογή με εντοπισμένο ψεκασμό από την καρποδέση μέχρι την ωρίμανση (Μάιος-Ιούλι) με δόση 450 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 1,5-30 λίτρα/στρέμμα. Εφόσον στον ίδιο αγρό προηγήθηκε ψεκασμός για την αντιμετώπιση των ζιζανίων την άνοιξη-καλοκαίρι, η εφαρμογή για την καταπολέμηση των παραφύων να πραγματοποιηθεί 30-45 ημέρες μετά την 1^η εφαρμογή.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτρολέμονο): Για ετήσια και πολυετή ζιζάνια (αγρωσώδη και πλατύφυλλα): Δύο εφαρμογές με κατευθυνόμενο ομοιόμορφο ή κατευθυνόμενο εντοπισμένο ψεκασμό από τα πρώτα φύλλα έως οι καρποί να φτάσουν το 90% του τυπικού τους μεγέθους (Απρ.-Σεπτ.) με δόση 340-450 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρ. Η 1^η εφαρμογή την άνοιξη-καλοκαίρι (Απρ.-Ιουλίου) ή εναλλακτικά σπαστά με δόση 225κ.εκ. + 225κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα με μεσοδιάστημα 30 ημερών και η 2^η εφαρμογή το φθινόπωρο. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 90 ημερών μεταξύ ανειστικής - καλοκαιρινής και φθινοπωρινής εφαρμογής.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Α. για εφαρμογές σε: Αγρούς μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, Καταστροφή της καλλιέργειας, Αγρούς πριν την κατεργασία του εδάφους για ποτά σιτηρών, μηδικής, σόγιας, Ακαλλήνευστες εκτάσεις, Βιομηχανικά και Αστικά Πάρκα, Δρόμοι αστικών πάρκων. Κατά μήκος οδοπροδρομικών γραμμών, Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών

(**) Ετήσια Ζιζάνια:

Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Αλεπουκούρι (*Alopecurus myosuroides*), Ετήσια Πόα (*Poa spp.*), Ήρα (*Lolium spp.*), Σατόριες (*Setaria spp.*), Πάνικο (*Panicum dichotomifolium*), Πολυκομπί (*Polygonum spp.*), Ρανούνκουλος (*Ranunculus spp.*), Ραπανιά (*Raphanus raphanistrum*), Αγριόβικος (*Vicia spp.*), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Πεντάνευρο (*Plantago spp.*).

(**) Πολυετή Ζιζάνια:

Αγρόπυρο (*Agropyron repens*), Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Βελούρα (*Sorghum halepense*), Κύπερη (*Cyperus rotundus*), Αρτεμισία (*Artemisia vulgaris*), Ζωχός (*Sonchus spp.*), Λατάβο (*Rumex spp.*), Κίριο (*Cirsium arvense*), Αγριοράβιδο (*Taraxacum officinale*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Μεγάλη Περικοκλάδα (*Calyptegia sepium*), Αλογοουρά (*Equisetum arvense*).

B^{1,2}. Άνοιξιάτικη-Καλοκαιρινή (Απρίλιο-Ιούλιο) Εφαρμογή με δόση 340-450 κ.εκ./στρέμμα

- ΕΛΙΕΣ: Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβρώμη (*Avena fatua*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Περίδικουλι (*Parietaria judaica*), Κολλιταδό (*Galium aparine*), Αντράκλα ή γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*). **Μετρίως ευαίσθητα**

ζιζάνια: Κόνυζα κοινή (*Conyza canadensis*) και η Αναγалиά (*Anagallis arvensis*) στη δόση των 340κ.εκ.

- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus blitoides*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Περιποκλάδι (*Convolvulus althaeoides*), Κόνυζα κοινή (*Conyza canadensis*), Μολόχα (*Malva sylvestris*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Αντράκλα ή γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Πρόσνη σετάρια (*Setaria viridis*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Στελλάριδα (*Stellaria media*), Βερόνικα (*Veronica persica*) και Λουβουδιά (*Chenopodium album*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Κόνυζα (*Conyza sp.*) και Πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*) και τα ζιζάνια Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη πορφυρή (*Cyperus rotundus*) και Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum*) στη δόση των 340κ.εκ.

G^{1,2}. Άνοιξιάτικη-Καλοκαιρινή (Απρίλιο-Ιούλιο) Εφαρμογή σε δόση 450 κ.εκ./ στρέμμα
- ΕΛΙΕΣ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Μολόχα (*Malva sylvestris*) και Αναγалиά (*Anagallis arvensis*). **Μετρίως ευαίσθητα:** Κόνυζα κοινή (*Conyza canadensis*).

- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίδα (*Echinochloa crus galli*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη πορφυρή (*Cyperus rotundus*) και Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Περίδικουλι (*Parietaria judaica*).

Δ^{1,2}. Φθινοπωρινή Εφαρμογή σε δόση 340-450 κ.εκ./στρέμμα

- ΕΛΙΕΣ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Καλεντούλα (*Calendula arvensis*, *Calendula officinalis*), Ραφανιά (*Diplotaxis erucoides*), (*Diplotaxis virgata*), Μολόχα (*Malva sylvestris*), Περίδικουλι (*Parietaria judaica*), Αντράκλα ή γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Πρόσνη σετάρια (*Setaria viridis*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) και Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριοράβιδο (*Taraxacum officinale*).

- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Μικρή Κόνυζα (*Conyza bonariensis*), Ραφανιά (*Diplotaxis erucoides*), Γαλατσίδα (*Chamaesyce prostrata*), Μαλάχη (*Malva neglecta*), Πόα κοινή (*Poa annua*), Σετάρια (*Setaria sp.*), Πρόσνη σετάρια (*Setaria viridis*), Πολυετής ζωχός (*Sonchus arvensis*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), και Βερόνικα (*Veronica persica*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Μολόχα (*Malva sylvestris*), Ήρα (*Lolium rigidum*) και Στελλάριδα (*Stellaria media*) και τα ζιζάνια Κόνυζα (*Conyza spp.*), Περίδικουλι (*Portulaca oleracea*) και Τσουκνίδα (*Urtica dioica*) στη δόση των 340κ.εκ.

E². Φθινοπωρινή Εφαρμογή στη δόση 450 κ.εκ./στρέμμα

- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κόνυζα (*Conyza sp.*), Περίδικουλι (*Portulaca oleracea*) και Τσουκνίδα (*Urtica dioica*).

ΣΤ². Καλοκαιρινή (Ιούλιο-Αύγουστο) Σπαστή Εφαρμογή 225+225 κ.εκ./στρέμμα
- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Ευαίσθητα ζιζάνια: Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Κύπερη πορφυρή (*Cyperus rotundus*) και Αντράκλα ή γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η εφαρμογή του να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό αποφεύγοντας την διασπορά των σπασμάτων του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. **2.** Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του είδους και του πληθυσμού των ζιζανίων. Για ετήσια ζιζάνια χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση, ενώ για πολυετή η υψηλότερη. **3.** Ο εντοπισμένος ψεκασμός για την καταπολέμηση των παραφύων να πραγματοποιείται όταν αυτές έχουν μήκος μικρότερο των 25 εκατοστών. Σε περίπτωση που η εφαρμογή πραγματοποιείται με επιπλέον ψεκαστήρα 15 λίτρων, εφαρμόστε 5-6 ψεκαστήρες ανά 10 στρέμμα. **4.** Για τον κατευθυνόμενο εντοπισμένο ψεκασμό σε ελιά ή εσπεριδοειδή η εφαρμογή να γίνεται στη γραμμή φυτεύσεως ή κάτω από το δέντρο (το οποίο αντιστοιχεί σε 150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα/εφαρμογή). **5.** Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας (μεταξύ 8 και 25 °C) και με υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (όχι κάτω από 60%). **6.** Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή σε διάστημα 3 ωρών. **7.** Μην γκρεμάτε όταν φυσάει. **8.** Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. **9.** Η συλλογή των καρπών σε ελιές και οπωρώνες εσπεριδοειδών επιτρέπεται μόνο από το δέντρο. **10.** Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή του σκευάσματος σε καρπούς ποσειμένου στο έδαφος. **11.** Να αποφεύγεται η επαφή των καρπών με το ψεκαστικό υγρό ή το έδαφος που έχει γίνει εφαρμογή.