



LENTAGRAN

45 WP

Pyridate
(χημική ομάδα: Φαινυλοπυριδαζίνες)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Pyridate 45 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 50% β/β

UFI: 4YJ0-W0T1-W00A-29QN

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **1 Κιλό (KG)**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,

PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70106/21.09.2021



Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο δρα ως αναστολέας του φωτοσυστήματος II, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος: Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*

Σκόρδο: Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο του 3^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150 γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Κρεμμύδι: Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο του 3^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150 γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Μηδική: Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 9 κόμβων της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150 γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Πράσο: Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο των 9 φύλλων της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150 γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Πράσινο Σπαράγγι: Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3^{ων} έως 9 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Αγκινάρα: Μεταφυτρωτικά μέχρι το στάδιο του 8^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι: Μεταφυτρωτικά περίπου 2-4 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση, από το στάδιο των 2 έως 6 φύλλων για το μπρόκολο και το κουνουπίδι και έως το στάδιο της αρχής σχηματισμού των κεφαλιών στο λάχανο. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Γλυκό Καλαμπόκι, Παπαρούνα (για παπαρουνόσπορο): Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3^{ων} έως 8 φύλλων της καλλιέργειας. Μία (1) εφαρμογή όταν τα ζιζάνια α) έχουν πάνω από 7 φύλλα με δόση: 200 γρ./στρέμμα (max), β) έχουν 3-6 φύλλα με δόση: 150γρ./στρέμμα (max). Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν 1-2 φύλλα με δόση: 100γρ./στρέμμα (max) και έως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες όταν τα ζιζάνια έχουν έως 1 φύλλο με δόση: 50γρ./στρέμμα (max).

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρέμμα): Σκόρδο, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι και Γλυκό Καλαμπόκι 20-60 λίτρα/στρέμμα. Υπόλοιπες καλλιέργειες: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή». • «Σε περίπτωση επανεξόδου μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια». • Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυνθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε τεχνητά αποστραγγιζόμενα εδάφη στις καλλιέργειες πράσου, κρεμμυδιού σκόρδου, πράσινου σπαραγγιού και παπαρούνας (για παπαρουνόσπορο).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στην περίπτωση μίας εφαρμογής (200 γραμ. σκ./στρεμ.) να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μία αμέσαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων για την καλλιέργεια μηδικής.

- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μία αμέσαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην περίπτωση μίας εφαρμογής (200 γραμ. σκ. / στρεμ.) ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη στην περίπτωση εφαρμογής 2 ή 3 στασιών εφαρμογών με μειωμένη δόση (100 ή 50 γραμ. σκ. / στρεμ. αντίστοιχα) ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 %.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό (με θερμοκρασία από 5 έως 30° C), καλά αεριζόμενο, και προστατευμένο από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και την υγρασία. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

1023

5 2 0 0 2 5 2 6 9 0 5 9 1 >

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε φιάλη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



Παρατηρήσεις:

- Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων.
- Η δόση εξαρτάται από τον αριθμό εφαρμογών και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων (μέγιστη δόση για την αγκινάρα 100 γραμ./στρεμ. και για τις λοιπές καλλιέργειες 200 γραμ./στρεμ.).
- Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10°C και 25°C.
- Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα.
- Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του.

***Καταπολεμώμενα ζιζάνια:** Αγριομπομπόκ (Abutilon theophrasti), Αναγαλιίδα (Anagallis arvensis), Αμάραντος (Amaranthus retroflexus), Ψευδοχαμομήλι (Anthemis arvensis), Γαλέωψη (Galeopsis sp.), Τάτολυμα (Datura stramonium), Δωδεκάνθη (Lamium amplexicaule), Λουβουδιά (Chenopodium album), Καφέλλα (Capsella bursa-pastoris), Ολιανσόγα (Galinsoga sp.), Κοινό χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Αγριοσταυριά ή Στρώγος (Solanum nigrum), Στάχυς (Stachys annua), Ψαλίδα (Bidens tripartita), Αγριόβιος (Vicia sp.), Μικρή τσουκνίδα (Urtica urens), Θάλαππι (Thlaspi arvense), Ερίγκερο (Erigeron canadensis), Σκαρόχορτο (Mercurialis annua), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολιτσίδα (Galium aparine), Σπέργουλα (Spergula arvensis), Πολύγονο (Polygonum convolvulus), Λατάτσκα (Polygonum lapathifolium).

Στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων το προϊόν καταπολεμεί τα ζιζάνια: Αιματόχορτο (Digitaria sp.), Μουχρίσκα (Echinochloa crus galli), Σεταρία ή σπονδυλωτή (Setaria sp.).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyridate που ανήκει στη ομάδα 6 (C3) κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην χρησιμοποιείτε υποπροϊόντα απορραπαγωγής για ζωοτροφή.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομόρφος ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συντηρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αναμίξετε την υδατοδιαλυτή σασκούλα. Να μην έρχεται σε επαφή με βρεγμένα χέρια ή γάντια.

Καθαρισμός συσκευασίας: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Στεγνάνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σκόρδο, Κρεμμύδι, Αγκινάρα, Παπαρούνα (για παπαρουνόσπορο), Πράσινο Σπαράγγι: Ορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

Μηδική, Πράσο: 28 ημέρες

Λάχανο, Μπρόκολο, Γλυκό Καλαμπόκι: 42 ημέρες

Κουνουπίδι: 49 ημέρες