

LIMCPA[®] Forte 50SL



Πυκνό διάλυμα (SL)

mcpa 50%

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: mcpa οξύ 50% β/ο
(υπό μορφή άλατος Διμεθυλαμίνης 61,24%)

Βοηθητικές ουσίες: 52,42% β/β

UFI: CPFP-U6E9-3GAA-WX7H

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμών / εκνεφώματα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδυμασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος».

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70166/21-07-2016

Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία

Κάτοχος της άδειας: NUFARM GmbH & Co KG,

St-Peter Strasse, 25-A-4021, Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας /

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

1123



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Ο., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός.

Τηλ.: 2310 568656

e-mail: info@efthymiadis.gr



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**Περιεχόμενο:
5 λίτρα e**

Nufarm
Grow a better tomorrow

Κατορία και τρόπος δράσης: Το **Limca Forte** απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται δαυσυσηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μερισματικούς ιστούς, όπου ανατρέφει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιπτώσεις και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστολή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σικάλη, Τριτκάλες): Για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από το τέλος του αδεφάγματος έως την έναρξη του καλαμώματος, με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 160-200 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **ΡΥΖΙ:** Για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από το τέλος του αδεφάγματος έως την έναρξη του καλαμώματος, με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων ζιζανίων εφαρμογή όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων, με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 160 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΙΔΕΙΑ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιφ φρουτ, Κίτρινα), ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καστανιά, Φουκουλιά, Καρυδιά), ΜΗΛΟΙΔΕΙΑ (Μηλιά, Αχλάδι, Κιδοανιά, Γαρύφαλλο), ΠΡΩΝΕΚΤΑΡΙΑ (Βερκάνια, Νεκταρίνια, Κερσάνια, Νεκταρίνια), ΕΛΙΑ: Για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων ζιζανίων εφαρμογή με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης με δόση: 240 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Βοσκότοποι αγρωστώδη / Λιβάδια αγρωστώδη:** Για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων ζιζανίων ανοικτήτα εφαρμογή με ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης με δόση: 240-320 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-60 λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις: 1. Να μην εφαρμόζεται όταν έχουν πέσει ελιές στο έδαφος. 2. Καταπολεπούμενα ζιζάνια: **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριο γογγύλι (*Brassica napus*), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Γεράνια (*Geranium spp.*), Βούρλο μικρό (*Juncus bufonius*), Βωδεδάνθι (*Lamium amplexicaule*), Ζωχός (*Sonchus arvensis*), Κατόνχορτο (*Fumaria officinalis*), Καρδωάνια (*Cardamine hirsuta*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λάμιο πορφυρό (*Lamium purpureum*), Λουβδόχο (*Chenopodium album*), Λουβδόχο πολυσπερμίο (*Chenopodium polyspermum*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Μυρρινό (*Scandix pecten-veneris*), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas*), Πεντάγευρα (*Plantago spp.*), Ρόκα (*Eruca vesicaria*), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** Αγριονοτιάτα (*Solanum nigrum*), Αγριοδάρο (*Taraxacum officinale*), Αναγαιλλίδα (*Anagallis arvensis*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Βερόνικες (*Veronica spp.*), Κερσάντιο (*Cerastium spp.*), Λάπαθα (*Rumex spp.*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Πικραλίδα (*Crepis capillaris*), Πολυκόμιο (*Polygonum aviculare*), Ρανουγκούλι (*Ranunculus arvensis* & *Ranunculus repens*), Ρατανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μικρό τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (50 PSI).

Τρόπος παρήσκευτος ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακατέψτε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και τη ρίχνουμε στο ψεκαστικό αναδευνίστα συνεχώς. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάδι με άφθονο καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Να εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 12°C και 20 °C. Καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν οι θερμοκρασίες αυτές διατηρηθούν για τις επόμενες 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.
- Για την αποφυγή της διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
- Αποφεύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, παγωνιά, νεροκρατήματα, ισχυροί παύσοι ανέμου κ.α.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο MCPA.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Γενικά: Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Ελέγχετε την αναπνοή και εφόσον είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν ο ασθενής είναι αναίσθητος, τοποθετήστε τον στο πάδι με το κεφάλι χαμηλωμένο από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα फैλιγμένα. **Σε περίπτωση εσπησης:** Μετακινείτε τον ασθενή από τον χώρο της έκθεσης σε καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα εμπίστομένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα. **Σε περίπτωση ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτα δια στόματος. Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαισθησίας:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Οδηγίες για τον γιατρό:** Συντάξτε αναγκαστική αλκαλική διούρηση. Ελέγχετε τη λειτουργία των νεφρών. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

UFI: CPPF-U6E9-3GAA-WX7H
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Στις περιπτώσεις αποτυχίας των ετήσιων καλλιεργειών είναι δυνατή η επανασπορά μετά από 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της προώθησης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος πριν σταγόνει το προϊόν. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον.

Στοιχεία φυτοεπικτότητας: Δεν είναι φυτοεπικότοξο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) / Σιτάρια, Αράβιτσος, Βοσκότοποι αγρωστώδη / Λιβάδια αγρωστώδη: 15 ημέρες. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: Μ.Ε. (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του ατμοσφαιρική συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται από πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τμήματα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενεργείας.



Ημερ. παραγωγής: Βλέπε
επί της
Αριθμός παρτίδας: συσκευασίας

