

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το MIMIC 24 SC, που περιέχει τη δραστική ουσία τεbufενοζιδε, είναι ένα εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των προνυμφών των λεπιδοπτερων. Το τεbufενοζιδε είναι ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων και δρα ως μιμητικό της εκδύσωσης, μιας ορμόνης αλλαγής του περιβλήματός των προνυμφών των λεπιδοπτερων. Προκαλεί την πρόωμη αλλαγή του περιβλήματός των προνυμφών με αποτέλεσμα το θάνατό τους μέσα σε 2-4 ημέρες. Δεν είναι διασυστηματικό και δρα κυρίως με κατάποση, ενώ έχει ελάχιστη δράση με επαφή. Είναι δραστικό κυρίως στις προνύμφες, λιγότερο στα ωά, ενώ δεν έχει δράση στα ακακία.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΟΕΙΔΗ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ): Για Φυλλοκνίστη (*Phylloxera citrella*) με μέγιστη δόση 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα ή 75-150 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ): Για **Καρπόκακα** (*Cydia pomonella*), **Φυλλοδέτες** (*Pandemis cerasana*) και **Φυλλορύκτες** (*Phyllocyter spp*) με μέγιστη δόση 70 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα ή 70-140 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο -Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερές.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΥΔΙΑ): Για **Καρπόκακα** (*Cydia pomonella*) με μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα ή 60 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού και όγκο ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών και κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο -Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά και τη Περγαμόντο.
2. Η χρήση στη Λεμονιά περιλαμβάνει και τη Κιτρολεμονιά.
3. Η χρήση στην Αχλαδιά περιλαμβάνει και τις Αχλαδιές Nashi.
4. Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή κάλυψη όλης της φυλλικής επιφάνειας των καλλιεργειών.
5. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.
6. Να μην χρησιμοποιείται δόση μεγαλύτερη από την μέγιστη συστασμένη ποσότητα του σκευάσματος ανά στρέμμα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικής φύσης τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: Το MIMIC 24 SC περιέχει τη δραστική ουσία **Τεbufενοζιδε**, η οποία ανήκει στην ομάδα 18 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν της ομάδας των διακυλδοδραζινών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε στις καλλιέργειες αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βρέχι. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξοραστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράφουν προηγούμενες με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό. Το προϊόν όταν εφαρμόζεται σε μηλιές μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις στη γεύση, το άρωμα και την υφή της σάλτσας μήλου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Πορτοκαλία, Λεμόνια, Μανταρίνια, Νεράντζια, Περγαμόντο, Κιτρολεμόνα: **14** ημέρες
- Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιές Nashi: **21** ημέρες
- Καρύδια: **30** ημέρες



MIMIC 24 SC

tebufenozide

(Χημική ομάδα: Διακυλδοδραζίνες)

Εγγυημένη Σύνθεση: Tebufenozide 24% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 76,3% β/β

UFI: 7MYC-3TFF-6W0T-HWE2

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **600 κ.εκ.**

Κάτοχος της έγκρισης:

Nisso Chemical Europe GmbH,

Berliner Allee 42, 40212 Duesseldorf, Γερμανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος,

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14938 / 11.11.2025



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ανοσήματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικρικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχομένου/περιεχίτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος»
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».
*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣ: συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα από το στόμα ή σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακί επιφαής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει συμβουλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση του τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχουν ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: 7MYC-3TFF-6W0T-HWE2

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- 20 μέτρα αψέκαστη ζώνη προστασίας σε Καρύδια.
- 20 μέτρα αψέκαστη ζώνη προστασίας στην περίπτωση μίας εφαρμογής σε Πορτοκαλιά, Μανταρίνια, Λεμόνια, Μηλιά, Αχλαδιά.
- 20 μέτρα αψέκαστη ζώνη προστασίας εκ των οποίων τα 5 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης για όμιμες πολλαπλές εφαρμογές από το τέλος της άνηξης έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 70-89) σε Πορτοκαλιά, Μανταρίνια, Λεμόνια, Μηλιά και Αχλαδιά.
- 20 μέτρα φυτική ζώνη ανάσχεσης για πρώιμες πολλαπλές εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την άνθηση (BBCH 51-69) σε Μηλιά και Αχλαδιά.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την τελική διάθεση των καρπών (ΒΒΧ 70-89) σε Πορτοκαλιά, Μανταρίνια, Λεμόνια, Μηλιά και Αχλαδιά. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του απορβίβητη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ήλιο και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

Βλέπε φιάλη

