

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΑΛΑΞΗΣ: «Φύλασσατε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. -Μην τρυπεί, πινεί ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Να φοράτε προστατωτικό γάντι / προστατευτικό ενδύμαντα. «Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανθεκτικότητας». «Να φοράτε γάντια / προστατευτικό ενδύμαντα και αναδιάρθρωση στην πλάτη διάρκεια της εφαρμογής». -Σε περίπτωση επικονιώσεων στην καλλιέργεια να φοράτε γάντια, μακριά παπούτσιαν και μακρινόκαυκο πουκάμισο. -Μηρηγούντες το νερό βορεί σα θυμάσια με την ισχύ που έχει σαρώσει την ουσία που έχει παραβεβαίωσεν την ισχύ του.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επιφράξης με τα μέτια: Επιπλέοντες προστακτικά με νέρο ή αργίτ λεπτά. Εάν υπάρχουν ρακοί επιφράξη, αφαίρεστε τους εφύρους είναι εύκαλπο. Συνέχιστε να έπινετε. Καλέστε το KENTRO ΔΗΜΗΤΡΑΙΟΣ ΛΕΩΝ ή συμβούλευτες ένα φρεσκάδικο. Σε περίπτωση επιφράξης με το δέρμα: Αφορέστε αμέσως τα ράγια στα οποία έπιπτε σκελετός ή μακρινόκαυκο ψυρά. Βοηθείτε με θύρων νερό και σπαστό. Ον αρρεβήσεις επιμένει, υγρασίους επιβεβαιώνετε γιατρό. Σε περίπτωση επινοτήσης: Μεταφερθείτε το παθώντα στον καρόβιο οδόν και αφορτήστε τον να ξεκουραιτεί στη σπούδα του διευλογών την αντινοτή. Υγρασίους ή παθώντας σε περιπτώσεις η παραπομπή στο νοσοκομείο ή συμβούλευση σε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμέτο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δημόπτηρων: 210779373.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική στοθερότητα σκευασμάτων: Διατηρείται στην αρχή της απορροφατικής ουσιαστικά σε χώρο θρό. Δροστροφή και καλό αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ακαρεοτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωκτού, προνυμφοκόντο και νυμφοκόντο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Μηλιά, Αχλαδιά: Για τετράνυχους (*Panonychus ulmi*). Φεκασμός με την έναρξη της προσβολής από την έκπτηση των οφθαλμών έως την αρχή της ωφαλωμός των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτρ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Αμπελί (ονοτοπήνης και επιπτραπέζιες ποικιλίες): Για τετράνυχους (*Tetranychus urticae*). Φεκασμός από την έναρξη της προσβολής-από την έκπτηση των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτρ. υγρ. (μέγιστο 20 κ.εκ. σκεύασμα/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Πιπέριας, Μελιτζάνες (θερμοκήπιο): Για τετράνυχους (*Tetranychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκούθα (θερμοκήπιο): Για τετράνυχους (*Tetranychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκούθα (θερμοκήπιο): Για τετράνυχους (*Tetranychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Επιτάλινετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νέρο και στη συνέχεια έπιτάλινετε τρεις (3) φορές με καθόρι νέρο μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευασμάτος.

Διάσηρψη Ανθεκτικότητας: Για μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται: -Εφαρμογή όλων των μη χρησιμών και πρακτικών ολοκληρωμένης διάσειρης ώστε να διαπροβείται ο πλήθυσμός των ακάρων σε χαρηρά επίπεδα. -Επενδύσεις όπων είναι απαραίτητο και στον κατάλληλο χρόνο, στοχεύουσται στα πιο εισιτήρια βιολογικά στόδια των ακάρων, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κινδύνος για τα ωφέλιμα έντομα. -Εφαρμογή του NISSORUN 25 SC στη εγκεκριμένης δόσεις και διαφορετικού τρόπου δράσης. -Νέανθρεγέτα συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζωάνων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμογεί το οκεάνετο: Να μην εισερχονται ανέρευτα ίχνα στην πλεκασμένη περιοχή πριν γενεύσουν εντελεύς το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοεξόπτηκση: Δεν είναι φυτοεξόπτηκση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συκευασίας: Οι φιλές και τα δοχεία έπιπλωνται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έπιπλωμα (τα νερά του έπιπλωμάτος τα ρίγουν στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αριστοτελοφόρων προηγμένων με τρόπων, για τη διασφάλιση της μη πεταρετήρη κρήτης, ενστηθείται σε σημεία στολγής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

K&NE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

NISSORUN® 25 SC

hexythiazox
(Ομάδα καρβοξαμίδων)

ΑΚΑΡΕΟΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθετη:
hexythiazox: 25% β/β
βοτ. ουσίες: 76,30% β/β

ΠΙΚΝΟΥΝ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

ΠΡΟΠΡΙΖΕΙΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φύλασσατε κλειδωμένα και μακριά από ποδιά
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 40 κ.εκ.

Katōpos της Eγκρίσης: Nissos Chemical Europe GmbH,
Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Γερμανία

Υπεννόηση για την τελική δύνηση στην αγορά.

Εργαστηκό ουσιαστικού: Διανομή:

ΚΑΝ ΕΥΡΥΜΑΙΔΑΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε., Η.Θ. 48, 570 22, Σινόδος,
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@ethytmias.gr

Αριθμ. Λειτείας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 2188/21-12-2015

Ακαρεοτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωκτού, προνυμφοκόντο και νυμφοκόντο

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΑΣ: Βάλτε φίλτρη ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
- **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:**
“Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση”

Πεπτόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκήπιο): Για τετράνυχους (*Tetralychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Πεπτόνι, Κερπότη, Κολοκύθα (υπαίθριο): Για τετράνυχους (*Tetralychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωφαλωμόν των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Φράουλες (υπαίθρια) και θερμοκήπιο: Για τετράνυχους (*Tetralychus urticae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως τη συγκομιδή. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκεύασμα/100 λίτ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Μένιστρος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών: Για Αμπελί δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημέρες. Για ολες τις υπόλοιπες καλλιέργειες μια (*) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πρώτο φθόνους τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Επειδή την δρώση ματιάτικο έχει μακροπλευριστική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μία εφαρμογή τον χρόνο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάζουσα φυλλώματα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού γύρου: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδείνοντας προσθέτετε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκεύασμάτος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευτη.

•Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αγγούριδας (πρώμες εφαρμογής) να αφήνετε μια απόκεντρη ίχνη στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

- Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αγγούριδας (ώμινες εφαρμογές) να αφήνετε μια απόκεντρη ίχνη στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

- Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αγγούριδας (ώμινες εφαρμογές) να αφήνετε μια απόκεντρη ίχνη στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

- Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αγγούριδας (ώμινες εφαρμογές) να αφήνετε μια απόκεντρη ίχνη στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδία: 28 ημέρες. Αμπελί: 21 ημέρες. Τομάτες (Υ&Θ), Πιπέριας (Θ), Μελιτζάνες (Υ&Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγούρακι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Πεπτόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Φράουλες (Υ & Θ); 3 ημέρες