

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός/ Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Φοράτε ολόσωμη φόρμα, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου, όταν χειρίζεσθε ή εφαρμόζεται το σκεύασμα. • «Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης φόρτωσης και της εφαρμογής». • «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι...». • Μακριά από θερμάτια/στιπιδιές/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / σταγονίδια / εκνεφώματα.
• Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια και το πρόσωπο μετά το χειρισμό.
• Βγάλετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. • Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. • Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / απορρίψτε ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

UFI: 75Q0-Q0MG-W00K-G18T

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



ONYX EC

Pyridate
(χημική ομάδα: Φαινυλοτυριδαζίνες)

Γαλακτωματοποίηση Συμπύκνωμα (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Pyridate 60% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 38,1% β/β

UFI: 75Q0-Q0MG-W00K-G18T

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εύφλεκτο υγρό ατμό
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,

PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος | Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@ethymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70271 / 15-02-2018

ZIZANIOKTONO



Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη δισυσστημιακό ζιζανιοκτόνο επαφής για πλατύφυλλα ζιζάνια στο καλοπώκι.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αραβόσιτος : Για Πλατύφυλλα ζιζάνια*- Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια έχει 2 έως 8 φύλλα μεταξύ των σταδίων BBCH 12-18, Μάιο-Ιούνιο, με δόση 50-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1 ή 2 εφαρμογές με (max) δόση: 75 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.

Παρατηρήσεις:

- Η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται όταν όλα τα ζιζάνια εμφανιστούν και η καλλιέργεια βρίσκεται στο σωστό στάδιο ανάπτυξης (2-8 φύλλα) και όχι υπό καταπόνηση.
- Για καλύτερο έλεγχο τα ζιζάνια πρέπει να ψεκάζονται όταν βρίσκονται σε ανάπτυξη και πριν φτάσουν το τέταρτο φύλλο.
- Εάν ο θόλος φυλλώματος της καλλιέργειας προστατεύει τα ζιζάνια, τότε η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού πρέπει να αυξηθεί.

Περιορισμοί:

- Εφαρμόστε μόνο σε ξηρές καλλιέργειες
- Η θερμοκρασία του ψεκαστικού διαλύματος και του αέρα θα πρέπει να είναι πάνω από 10°C σε κάθε ψεκασμό.
- Η υπερδοσολογία (διπλοκατάσπαση) καθώς και η μεταφορά ψεκασμού με τον αέρα πρέπει να αποφεύγονται.
- Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες υπό καταπόνηση πχ από ξηρασία, ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών ή όπου μια προηγούμενη θεραπεία έχει αφαιρέσει το κερύ των φύλλων.
- Μην εφαρμόζετε σε περιόδους που οι θερμοκρασίες τη νύχτα πέφτουν κάτω από τους 2°C ή όταν οι θερμοκρασίες τη μέρα ξεπερνούν τους 18°C.

***Καταπολεμώμενα ζιζάνια:**

Ευαίσθητα στο ONYX ζιζάνια: Λουβουδιά (*Chenopodium sp.*) Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*) Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*) Λάμιο (*Lamium amplexicaule*, *Lamium purpureum*) Λουβουδιά (*Atriplex patula*) Κολητσιδα (*Galium aparine*) Αγριοσταυριά (*Solanum nigrum*) Λαψάνα-σινάπι (*Sinapis arvensis*).

Μέτρια ευαίσθητα στο ONYX: Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*) Γεράνι (*Geranium dissectum*) Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλκεστεί: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας: - Εφαρμόστε εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ). - Κάντε εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε με καθολικό ψεκασμό, με μέγιστη πίεση 2 bars. Απαραίτητη η καλή κάλυψη των ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε μέχρι τη μέση το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό και ανακινήστε. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ONYX στο διάλυμα και συνεχίστε να ανακινείτε προσθέτοντας το υπόλοιπο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφρονο νερό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Εάν εμφανισθούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας, αυτά είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας. Να μην εφαρμόζεται στο γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαράγωγη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αραβόσιτος: **Δεν ορίζεται** (Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φύλλο



0124