

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. • Μην πνίξετε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Πλύνετε τα λερωμένα με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση». • «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». • «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

• Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέαση ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **5 μέτρων** σε πατάτα, **20 μέτρων** σε αμύγδα, τομάτα, κολοκυνθοειδή, κρεμμύδι, σκόρδο και ασκαλώνα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Χρησιμοποιήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενων με τρύπωμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέτρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Ημίνια παραγωγής: Βλέπε στην επιφάνεια του δοχείου
Αριθμός παρτίδας:



PRESIDIUM ONE SC

Zoxamide

(χημική ομάδα: Βενζιμιδαζολών)

Dimethomorph

(χημική ομάδα: Μορφολινών)

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: Zoxamide 18 % (β/ο) +
Dimethomorph 18 % (β/ο)
Βοηθ. ουσίες: 66,01 % β/β

UFI: CEF0-C0N6-A002-64V3

KINΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει **Zoxamide**.
- Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας/ Παρασκευαστής σκευάσματος:
Gowan Crop Protection Limited,
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood,
Reading, Berkshire RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόβας | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60646 / 17-10-2017

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **PRESIDIUM ONE SC** είναι μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε διάφορες καλλιέργειες. Είναι μίγμα δυο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης: το Zoxamide της ομάδας των Βενζιμιδαζολών, προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των οωμυκτιών εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σποριών. Το Dimethomorph που ανήκει στην ομάδα μορφολινών, με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση, απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση. Δρα στο σύνολο του κύκλου ανάπτυξης του παθογόνου οργανισμού-στόχου και, παρότι είναι θεραπευτικό, συστήνεται να χρησιμοποιείται προληπτικά. Ο στόχος του είναι ένα ένζυμο, η συνθετάση κυτταρίνης, η οποία εμπλέκεται στην βιοσύνθεση της κυτταρίνης (κύριο συστατικό του τοιχώματος των βακτηρίων).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο σταφύλια): Για Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*) με 100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 4^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες.

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλόνια: Για Περονόσπορο (*Plasmopara destructor*) με 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.. Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 3^{ου} φύλλου της καλλιέργειας (>3εκ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες.

Τομάτα (Υπαίθρου): Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) με 83-100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.. Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 3^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες.

Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι, Πεπόνι (Υπαίθρου): Για Περονόσπορο (*Pseudoperonospora cubensis*) με 83-100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.. Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 1^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες.

Πατάτα: Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*) με 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.. Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 1^{ου} πνευκτικού βλαστού της καλλιέργειας (5 εκ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-120 λίτρα / στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-10 ημέρες (έως 3 συνεχόμενες εφαρμογές).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο οχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορροπώστε και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά υποδήματα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): **28 ημέρες**

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλόνια: **14 ημέρες**

Τομάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κολοκυθάκι, Πεπόνι (Υπαίθρου): **3 ημέρες**

Πατάτα: **7 ημέρες**

