



PROFIL® EXTRA 5 SL

acetamiprid **ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**
(χημική ομάδα νεονικοτινοειδή)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Acetamiprid: 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 95,28% β/β

UFI: XNFS-CD8T-6V06-23XX

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υποπνοί για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφευχθούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 4 λίτρα

Κάτοχος της έγκρισης:

NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH,
Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Γερμανία

Υπευθύνος επικοινωνίας / Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά-Διασπορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14620 / 15-09-2017

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **PROFIL Extra 5 SL** είναι εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Δισασηματικό εντομοκτόνο, επαής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυρμηγκιών εντόμων όπως οι ασιόδες, αλευρώδεις και εναντίον ορισμένων Λεπιτοπτέρων, Κολοκυνθιδών, Διπτερών και Θριπών. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοντινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΔΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. «Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. «Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεων. «Φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικό ρουχισμό/ κατάλληλα υποδήματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού». • Διάθεση περιεχομένου/περιεχτή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

• **Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.** (Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά υδάντα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- Για να αφεσκατή ζώνη προστασίας με βλάστηση **10 μέτρων** από επιφανειακά υδάντα για τις καλλιέργειες: τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, κολοκυθονειδή, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ψυχρόλαβο, δαμάκη, ακινάδα, πατάτα, ελασικόφυτη, καπνό, φυτώρια αμπελιού, καλλιμαστίδια.
- Για να αφεσκατή ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από επιφανειακά υδάντα για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών, του Αμπέλιου, των Σμέουρων και των Βατόμουρων.
- Για να αφεσκατή ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από επιφανειακά υδάντα για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών και των Περηνόκαρπων.

Επιπλέον για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΕΣ: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μέρη με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαίρεστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας. Να ξεπλύνετε καλά, με νερό και σαπούνι και τέλος πλύνε με νερό. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγείτε τίποτα στον παθόντα. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση **επαισιότητας**, μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Αντιδότο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Χρησιμοποιείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UFI: XNFS-CD8T-6V06-23XX

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (να νερό του ξεπλύνματος να ρίχνουμε στο δοχείο χημικών) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αποτινούνται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευασμάτων: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική φραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

PROFIL® EXTRA 5 SL

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Κίμιντες, Λεμόνι, Γκρέι φρουτ, Κίτρι, Περηνόκατο, Νερατζιά, Μοσχολέμονο (Λάρι), Κουμ-κούτ, Φράπα): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Βρωμιάδες, Κολοκυνθιδές, Μύγα Μεσογείου και Φυλλοκίστες με 100-150 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.) Για Τηλίκια με 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φυτόσκαμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 150-100 λίτρα/στρέμμα.
Μελιτζάνα (Μελάνη), Αγκούδα, Κουκουνάρι, Περνίον: Για Αφίδες, Μελάνη και Μύγα Μεσογείου με 100-150 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.) Για Ψύλλες (ενήλικα), Φυλλοκίστες, Κηλιδώδεις, Τηλίκια και Βρωμιάδες με 100 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φυτόσκαμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Περνιόκατα (Ροδάκινο, Βανίλι, Καραντί): Για Αφίδες, Μύγα Μεσογείου, Ροδάκι κερσάδα, Δροσόφιλα και Φυλλοκίστες με 130-200 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Για Φυλλοκίστες, Τηλίκια και Βρωμιάδες με 100 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φυτόσκαμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Αμπέλι (ονομαστικά και επιτραπέζια ποικιλίες): Για Κολοκυνθιδές, Μύγα Μεσογείου, Δροσόφιλα, Φυλλοκίστες, Χρονόκατα, Αφίδες και Θρίπες (εκτός από F. occidentalis) με 200 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Για Φυλλοκίστες και Τηλίκια με 150 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση της ταχυσθένιας μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα.
Σμέουρα, Βατόμουρα: Για Αφίδες, Δροσόφιλα, Τηλίκια και Ανθόμυγα με 180 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 180 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο όπου οι βλαστοί έχουν το 80% του τελικού μήκους τους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθριοι και Θερμοκηπτικοί): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Δροσόφιλα, Κολοκυνθιδές, Βρωμιάδες, Τηλίκια και Λυριόμυγα με 200-300 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Για Πυρρλόκατα πιπεριές με 160-250 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 180 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού ανθού μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Κολοκυθονειδή (μη εδωδύμους φρούτα): Πεπόνι, Καρπούδι, Κολοκύθα (Y) & Κολοκυθονειδή (εδωδύμους φρούτα): Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Y+Θ): Για Αφίδες και Αλευρώδεις με 200-300 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του νερού πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Ανανάδες: Για Αφίδες με 150-250 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5° προγαμτικό φύλλο μέχρι την εμφάνιση της ανάπτυξης του εδωδύμους μέρους. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Ανθοκάρφες (Μελάνη, Κουνουπίδι), Καραντίες κρύβειες (εκτός από λαχανόκατα Βραζιλιάνι) (Λάχανο, Λάχανο σαβοί, Κόκκινο Λάχανο, Λευκό Λάχανο), Βρωμιάδες και Κολοκυνθιδές (Αλμυρά) με 160-250 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 2° προγαμτικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδωδύμους μέρους. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Ψυχρόλαβο: Φυλλοκίστες, Πιπεριά, Φυλλοκίστες (εκτός από λαχανόκατα Βραζιλιάνι) (Λάχανο, Λάχανο σαβοί, Κόκκινο Λάχανο, Λευκό Λάχανο), Αμπέλι (ονομαστικά και επιτραπέζια ποικιλίες), Βρωμιάδες, Τηλίκια και Λυριόμυγα με 160-250 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9° προγαμτικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λαβοί αποκόπτονται το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Πατάτα: Για Αφίδες, Δροσόφιλα και Βρωμιάδες με 150-200 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 130 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5° φύλλο του καρπού βλαστού μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της καρπώδους. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα/στρέμμα.

Βατόμουρα: Για Αφίδες και Καρπ Βρωμιάδων (χρήση φρασών σημειώνεται) με 150-200 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9° προγαμτικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λαβοί αποκόπτονται το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα/στρέμμα.

Ελασικόφυτη: Για Αφίδες, Βρωμιάδες, Αλμυρά και Κολοκυνθιδές με 150-200 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 130 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9° φύλλο μέχρι το στάδιο που το 50% των λαβών αποκόπτονται το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα/στρέμμα.

Μελάνη: Για Αφίδες, Αμιο και Γυμναστές με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. σκευασμά/λίτ. Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9° προγαμτικό φύλλο μέχρι την έναρξη των ανθέων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-80 λίτρα/στρέμμα.

Καμπίς: Για Αφίδες και Αμιο με 200-300 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9° προγαμτικό φύλλο μέχρι το στάδιο που το φύλλο έχουν αποκόπτεται το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Ανθοκακά, Καλλιμαστίδια (Y+Θ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Βρωμιάδες, Τηλίκια και Λυριόμυγα με 200-300 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5° προγαμτικό φύλλο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι (φυτώρια): Για Αφίδες, Φυλλοκίστες αμπελιού, Τηλίκια, Κολοκυνθιδές και Φυλλοκίστες με 200-300 κ.εκ.

σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5° προγαμτικό φύλλο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Καλλιέργειες για αποποταρυνή: **Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυθονειδή (μη εδωδύμους και μη εδωδύμους φρούτα), Λάχανο και Καραντί, Μαρούλι και άλλα λαχανόκατα, Ψυχρόλαβο, Πατάτα, Αγγούρακι, Ελασικόφυτη κ.α.:** Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Βρωμιάδες, Αμιο, Τηλίκια και Φυλλοκίστες με 200-300 κ.εκ. σκευασμά/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευασμά/λίτ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

- Σμέουρα, Βατόμουρα: 2 εφαρμογές ανά **20 ημέρες**.
- Αγγούρα, Πατάτα, Ανανάδες (Μελάνη, Κουνουπίδι), Καραντίες κρύβειες (εκτός από λαχανόκατα Βραζιλιάνι) (Λάχανο, Λάχανο σαβοί, Κόκκινο Λάχανο, Λευκό Λάχανο), Μελάνη: 2 εφαρμογές ανά **25 ημέρες**.
- Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθριοι και Θερμοκηπτικοί), Κολοκυθονειδή: Πεπόνι, Καρπούδι, Κολοκύθα (Y), Αγγούρα, Αγγουράκι, Κολοκύθα (Y+Θ), Αμπέλι (ονομαστικά και επιτραπέζια ποικιλίες), Ανθοκακά, Καλλιμαστίδια (Y+Θ), Αμπέλι (φυτώρια), Καλλιέργειες για αποποταρυνή: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυθονειδή (μη εδωδύμους και μη εδωδύμους φρούτα), Λάχανο και άλλα λαχανόκατα, Ψυχρόλαβο, Πατάτα, Αγγούρακι, Ελασικόφυτη κ.α.: 2 εφαρμογές ανά **25-28 ημέρες**.
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Κίμιντες, Λεμόνι, Γκρέι φρουτ, Κίτρι, Περηνόκατο, Νερατζιά, Μοσχολέμονο (Λάρι), Κουμ-κούτ, Φράπα), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλάδι, Κιδανιά, Μοσχόμυρο), Περνιόκατα (Ροδάκινο, Βανίλι, Καραντί) 2 εφαρμογές ανά **30 ημέρες**.
- Ψυχρόλαβο: Φασολόκα προπύα, Φασόλα (εφόσον με λαβή και χωρίς λαβή), Αρακάς, Μπιζιλία, Πατάτα: Φασόλα (ηρό), Ρεβίθια, Φασόλα, Κουκιά, Φόβα: 2 εφαρμογές ανά **30-45 ημέρες**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Ταξίδος των δασκάλων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
- 2) Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.
- 3) Αποφύγετε τη χρήση κατά την ανθοφορία.
- 4) Στις καλλιέργειες βαβάκι, ελασικόφυτη και καμπίς επιτρέπεται μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο. Στις υπόλοιπες καλλιέργειες μην υπερβείτε τις 2 εφαρμογές ετήσιες.

«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην Καρπ Βρωμιάδων του Βαθικόπου. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απώλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του σκευασμάτος».

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευασμάτος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναλόγως. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Σε περίπτωση μείγματος με άλλα σκευασμάτα που περιέχουν βίες δραστικές ουσίες πρέπει να γίνεται δοκιμαστικός ψεκασμός σε μικρό τμήμα του αγρού πριν τη χρήση σε ευρεία κλίμακα.

Χρονικά διαστήματα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να αποφευχθεί η επανεπίσκεψη στους αγρούς μετά το ψεκαστικό διάλυμα.

Εν εστιάσει εφαρμογών στην εμφάνιση των προσβολών αμέσως μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (γάντια, φόρμα εργασίας και κατάλληλα υποδήματα).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των καλλιεργησόμενων ειδών και ποικιλιών καλλιμαστικών φυτών απαιτείται πριν τον ψεκασμό της καλλιέργειας να γίνει δοκιμή σε μικρό τμήμα αγρού.

Διακρίσεις της ανεπιθύμητης έκθεσης: 1. Να χρησιμοποιούνται οι ατράντηξ ή οι ατράντηξ-πυκνωτές διασφίξις προκειμένου να μειωθεί η ανεπιθύμητη έκθεση στο αέριο. 2. Να αποφευχθεί η χρήση του σκευασμάτος σε καλλιέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικοτινοειδή σκευασμάτα, καθώς επίσης και στις περηνόκατες που σκευασμάται από τα ίδια καλλιέργειες. 3. Σε περίπτωση μείγματος με άλλα σκευασμάτα που περιέχουν βίες δραστικές ουσίες πρέπει να γίνεται δοκιμαστικός ψεκασμός σε μικρό τμήμα του αγρού πριν τη χρήση σε ευρεία κλίμακα.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των φυλλώνων αρθροπόδων: 1. Σε θερμοκήπια που έχουν εφαρμογή του σκευασμάτος, η εμφάνιση βακτηρίων (για επικονίαση των ανθέων) ή/και ορισμένων ακάρεων, να γίνεται μόνο μετά το πέρας των εδωδύμους μέρους των καρπών. 2. Η εμφάνιση των ανθέων πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευασμάτος. 3. Η εμφάνιση του αρθροποτικού όλου θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευασμάτος. 4. Επιβάλλεται η διατήρηση απεικονικής ζώνης ξένων εντερικών σε ποσοστό 5% για τη προστασία του φυλλώματος εντόμου C. noli.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Περνιόκατα, Αμπέλι, Κολοκυθονειδή με μη εδωδύμους φρούτα, Ανθοκακά (Μελάνη, Κουνουπίδι), Καραντίες κρύβειες (εκτός από λαχανόκατα Βραζιλιάνι) (Λάχανο, Κόκκινο Λάχανο, Λάχανο σαβοί, Λευκό Λάχανο), Ψυχρόλαβο, Πατάτα, Βαβάκι, Μελάνη, Καμπίς: **14 ημέρες**.

Σμέουρα, Βατόμουρα, Αγγούρα: **7 ημέρες** (Υπαίθριοι), 3 ημέρες (Πιπεριές, Μελιτζάνες). 7 ημέρες (Υπαίθριοι), 3 ημέρες (Εσπεριδοειδή).

Κολοκυθονειδή (μη εδωδύμους φρούτα): **7 ημέρες** (Υπαίθριοι), 3 ημέρες (Εσπεριδοειδή).

Ελασικόφυτη: **3 ημέρες**.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

