



Ranman[®] TOP SC

Cyazofamid

(χημική ομάδα Κυανοϋμιδαζολών)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Cyazofamid 16% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 84,17 % β/β

UFI: 0K5C-79EJ-H09D-USPQ

Προστατευτικό μυκητοκτόνο με ικανή διελασματική δράση και μερική υπολειμματική διάρκεια για την αντιμετώπιση του περονόσπορου.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Περιέχει 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) και 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **500 κ.εκ.**

Κάτοχος της άδειας: ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus park, De Kleelaan 12B - Box 9, 1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ ΑΒΕΕ

ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόβ, Θεσ/νίκη

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61132 / 19-10-2023

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το RANMAN TOP είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με ικανή διελασματική δράση και μερική υπολειμματική διάρκεια για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στις καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μελιτζάνας, κρεμμυδιού, σκόρδου, ασκαλώνιας, φρέσκου κρεμμυδιού, πεπονίου, καρπούζιου, κολοκυθίου, κολοκύθας και σε αγγουρίλαγουράκι. Η δραστική ουσία cyazofamid ανήκει στους παραμιθοειδείς Qi και διακόπτει την μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μυτοχονδρίων των ωομικητών.

Ελέγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη **φωτοτοξικότητα** από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.

2. Η χρήση στο κρεμμύδι περιλαμβάνει και το πράσο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμο φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμα της. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναθεωτώντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή οδεύστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίζει: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Cyazofamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 21 κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται: • η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας και • η εφαρμογή του σκευάσματος πριν την εμφάνιση της ασθένειας.

Στοιχεία φωτοτοξικότητας: Δεν είναι φωτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Φρέσκα κρεμμυδιού, 7 ημέρες
Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ), Κολοκύθι (Υ), Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ): 3 ημέρες

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Πατάτα, Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*). Δόση: max. 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα. Ψεκάσιμος φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο της ανάπτυξης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιερητική περίοδο:** 6 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Φρέσκα κρεμμυδιά: Περονόσπορος (*Peronospora destructor*). Δόση: max. 62,5 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-60 λίτρα. Ψεκάσιμος φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εφαρμογή του 2^{ου} πραγματικού φύλλου. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιερητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ) (Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα), Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ) (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι): Περονόσπορος (*Pseudoperonospora cubensis*). Δόση: max. 50 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα. Ψεκάσιμος φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το στάδιο της ανάπτυξης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιερητική περίοδο:** 6 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες μελιτζάνας και σκόρδου. Δεν έχει γίνει

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο δερματικός ερεθισμός επιμένει. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την επίστρα. Μην προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.**

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο κατά την ανάμιξη /όρθωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. Συστήνεται η χρήση γαντιών.» «Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, μην εφαρμόζετε ποτέ καθαρό παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών»
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφηρέσει μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες κρεμμυδιού, σκόρδου, ασκαλώνιας και φρέσκων κρεμμυδιών.

UFI: 0K5C-79EJ-H09D-USPQ

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύσιμο (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρίπωμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φωτοπροστατευτικού προϊόντος: Αποθηκεύεται στην αρχική του παραρטיστυ συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

