

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Διάθεση περιεχομένου/περιεκτῆ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

•Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή. •Κατά την επανέσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια. •

•Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αδιάκοπη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων να μην εφαρμόζεται το προϊόν ή άλλο προϊόν που περιέχει τη δραστική nicosulfuron περισσότερες από μία φορές ανά 3 χρόνια.

UFI: NKJE-KD57-N095-THX2

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του απορροβιακή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30°C.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε φιάλη



SAMSON® MAX 6 OD

Nicosulfuron

(ομάδα πυριμιδινυλσουλφονουλουργία)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)

Εγγυημένη σύνθεση:

Nicosulfuron: 6% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 93,69 % β/β

UFI: NKJE-KD57-N095-THX2

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Nicosulfuron.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας:

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B, Bus 9, Diegem B-1831, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70471/02.11.2022

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων και ορισμένων πολυετών ζιζανίων στον αραβόστο. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξείγαλακτικού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αραβόστος

ΣΤΟΧΟΣ: Μία εφαρμογή (1) από το στάδιο των 2-8 φύλλων της καλλιέργειας, για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων και ορισμένων πολυετών ζιζανίων, με δόση 50-75 κ.ε. σκευάσματος/ στρέμμα. Ογκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

1. Τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι ευαίσθητα έως το αδέφρωμα. Τα πλατύφυλλα ζιζάνια έως τα 6 φύλλα.

Δόση 50 κ. ε./ στρέμμα

Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (*Digitaria spp.*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Τάτουλας (*Datura stramonium*).

Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis*).

Δόση 67 κ. ε./ στρέμμα

Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (*Digitaria spp.*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis*).

Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Στύμφος (*Solanum nigrum*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*), Σετάρια (*Setaria sp.*), Βέλιουρας από ρίζωμα (*Sorghum halepense*).

Δόση 75 κ. ε./ στρέμμα

Καταπολεμούμενα ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*), Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βέλιουρας από ρίζωμα (*Sorghum halepense*).

Καταπολεμούμενα μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Στύμφος (*Solanum nigrum*), Έλυμος (*Elymus repens*).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση μικρότερη των 2,5 atm (40psi) και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδέυση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά.
- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και προσθέστε αμμωνία οικιακής χρήσης 3% (100 κ.ε. σε 200 λίτρα νερό). Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος για 10 λεπτά, υπό συνεχή ανάδευση. Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο με καθαρό νερό.
- Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία.
- Χρησιμοποιήστε το ίδιο διάλυμα για το ξεπλύμα των φίλτρων και των μπεκ και στη συνέχεια ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολεισθεί: 1. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπού. 2. Να μη ψεκάζετε όταν φυσάει ή όταν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία nicosulfuron, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:

- Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.).
- Εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το SAMSON MAX 6 OD στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόστος και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Για σπορά χειμερινών σιτηρών (σίπρι, κριθάρι, σίκαλη, triticale) θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και να προηγηθεί βαθιά άροση. Για οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, σπορά την επόμενη άνοιξη (1έτος μετά) από την εφαρμογή του SAMSON MAX 6 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

- της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής.

