

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτική σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Φοράτε γάντια για την συντήρηση του ψεκαστήρα κατά την εφαρμογή.».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται φυτική ζώνη ανάσχεσης **10-12 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

UFI: 40Q0-Q07Q-900K-5C3P

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Μην επαναχρησιμοποιείτε τις συσκευασίες. Ξεπλύνετε τις φιάλες ή τα δοχεία και προωθήστε τα στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.



SINOPIA ZC



**Metobromuron 40% + Clomazone 2,4%
(Ομάδα Φαινολουριών + Isoxazolidinones)**

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

**Μείγμα Εναιώρηματος μικροκαψουλών
και Συμπυκνωμένου Αιωρήματος (ZC)**

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Metobromuron 40% β/ο
Clomazone 2,4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 62,9 % β/β

UFI: 40Q0-Q07Q-900K-5C3P

**Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση πλατύφυλλων και ορισμένων ετήσιων
αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας.**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της άδειας: CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70444 / 19.01.2022

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Το μετοβρομυρον απορροφάται από τις ρίζες (κυρίως) και τα φύλλα. Καταστρέφει τα ζιζάνια μέσω αναστολής της φωτοσύνθεσης. Το κλομαζόνη απορροφάται από τις ρίζες και τους βλαστούς και μετατοπίζεται προς το πάνω μέρος του φυτού. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΤΑΤΑ: Μία (1) εφαρμογή **προφυτρωτικά** με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων και ορισμένων ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, με max δόση: 300 κ.εκ. σκευάσ./στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-40 λίτρα/στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση της καλλιέργειας πριν οι κοτυληδόνες/ κολεόπτριλα είναι κοντά στην εδαφική επιφάνεια.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του.

Καταπολεμούμενα - ευαίσθητα ζιζάνια: *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Polygonum aviculare* (Πολικόμπι), *Solanum nigrum* (Στίφυρος - αγριοντοματιά)

Καταπολεμούμενα - Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα)

Τρόπος εφαρμογής: Καθολική εφαρμογή σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Πριν ξεκινήσετε το γέμισμα του δοχείου του ψεκαστήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχεται σε αυτό κανένα υγρό ή στερεό υπόλειμμα από προηγούμενη χρήση. Ανακινήστε το SINOPIA πριν από τη χρήση. Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστήρα με καθαρό νερό έως το 50% του απαιτούμενου όγκου. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης και προσθέστε σταδιακά το προϊόν. Τέλος προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Διατηρείστε την ανάδευση έως το τέλος του ψεκασμού. Μην προετοιμάζετε ποτέ περισσότερη ποσότητα από την απαραίτητη. Αποφύγετε να ανοίγετε περιέκτες μεγαλύτερους από αυτούς που χρειάζεστε για άμεση χρήση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Καμία.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιδαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **metobromuron** και τη δραστική ουσία **clomazone**, οι οποίες ανήκουν τις ομάδες 5 και 13 αντίστοιχα κατά HRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ή καθυστέρηση ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η χρήση του σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (π.χ. αμειψισπορά, μηχανική μέθοδος κ.λπ.).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μόνο ριζώδεις και φυλλώδεις καλλιέργειες μπορούν να καλλιεργηθούν μετά από 120 ημέρες από την εφαρμογή. Στην περίπτωση που ριζώδεις καλλιέργειες φυτρώσουν πριν τις 120 ημέρες από την εφαρμογή, οι κορυφές τους δεν πρέπει να χορηγούνται ως ζωοτροφή στα ζώα.

Στα πλαίσια αμειψισποράς μπορούν να καλλιεργηθούν:
- σιτηρά τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την εφαρμογή,
- φυλλώδεις και ριζώδεις καλλιέργειες τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες μετά την εφαρμογή,
- όλες οι υπόλοιπες καλλιέργειες τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά την εφαρμογή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): **Πατάτα:** Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (προφυτρωτικά).

Ημερ. παραγωγής: Βλέπε
επί της
Αριθμός παρτίδας: συσκευασίας



1223

