

**Συνδυαστικότητα:** Δε συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, carban.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ σε μερικά Καλλιπωστικά). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

- Αμπέλι, Ακτινίδια: Μη εφαρμοσίμο (εφαρμογή στο στάδιο του ληθάργου)
  - Λοιπές καλλιέργειες (Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά, Ελιά): 21 ημέρες
- Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκευάσμα οφείλουμε να τηρούμε την «τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάντα από 21 ημέρες).

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτό:**

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Αντιδοτό: Συμπτωματική θεραπεία.
- ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UFI : PW57-M21F-HD9T-N56T

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ζέπλυμα (να νερά του ζεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίπωμα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποθεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:** Διατηρείται στην αρχική του απορβασίσιμη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



# SUN OIL 7 E

**paraffin oil**  
(χημική ομάδα: white mineral oil)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

**Υγρό γαλακτωματοποίησιμο (EC)**

**Εγγυημένη σύνθεση:**

Paraffin oil (Cas 8042-47-5): 99,1% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 0,9% β/β

UFI : PW57-M21F-HD9T-N56T

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.



**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο**

**Κάτοχος της έγκρισης -Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά :**

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthyimiadis.gr

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1234/30.3.1981

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**  
Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτερών.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΑΜΠΕΛΙ - ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ:** για χειμερινά αυγά κόκκινου τετράνυχου. Δόση: 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπτα):** για Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκόκκο, Λεκάριο, Ασπρή ψώρα, Μαύρη ψώρα, άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχος, Αλευρώδεις. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιανουαρίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα (Φεβρουάριο-Μάρτιο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιές, Αχλαδιές):** για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβάκδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Ψάλλα, Αφίδες. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκίες, Κερασιές, Ροδακινίες, Νεκταρινιές, Δαμασκηνιές), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβάκδα, Σφαίρολεκάριο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

**ΕΛΙΕΣ:** για Λεκάριο, Αστειώδεις, Παρλατόρια, Πολνία, Μυτιλόμορφη ψώρα, Βαμβάκδα, Προνύμφες εντόμων. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

**ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** για Κοκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδέτες, Αφίδες. Δόση: 1000-1300κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης β) καλοκαιριού γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

**ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ) ΣΤΡΕΜΜΑ:**

Αμπέλι - Ακτινίδια: 50, Εσπεριδοειδή: 200 - 400, Μηλοειδή - Πυρηνόκαρπα:150 - 250, Αμυγδαλιά: 100 - 200, Ελιά: 150 - 300, Καλλιπωστικά: 80.

**Παρατηρήσεις:**

- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
- Κατά τη χρήση του SUN OIL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζετε μία βδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
- Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαρομένα και σε περιόδους έντονης ζερασίας.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκευάσμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32° C γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
- Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ζερασίας και υπερβολικής υγρασίας.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκευάσμα επί 30 μέτρων πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
- Στα μηλοειδή και ειδικά στο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ να μην προηγηθεί ή έπεται εφαρμογή carban, folpet, δινιτροενώσεων, carbaryl σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 atm) και υπεκ τύπου σκούπας.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιομορφο γαλακτώμα και το ριχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο ανάθετος. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλακτώμα του ορυκτελαίου αναδεύεται καλά. Σε περίπτωση που το αναμιχουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε πρώτα το αραιωμένο γαλακτώμα ορυκτελαίου και μετά προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.



ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: **Βλέπε φιάλη**  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

