

### Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων *Alopecurus myosuroides* (αλεπουρά), *Avena spp.* (αγριοβρώμη), *Phalaris spp.* (φάλαρη), *Lolium spp.* (ήρα), *Milium vermale* (μίλιο) στην καλλιέργεια σιταριού (μαλακού και σκληρού). Απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**Σιτάρι (μαλακό και σκληρό):** Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 3<sup>ο</sup> φύλλο της καλλιέργειας μέχρι το τέλος του αδελφώματος για: Αλεπουρά (*Alopecurus myosuroides*) και Αγριοβρώμη (*Avena spp.*) με μέγιστη δόση 17 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, Φάλαρη (*Phalaris spp.*) και Μίλιο (*Milium vermale*) με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, Ήρα (*Lolium spp.*) με μέγιστη δόση 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για αποφυγή ζημιών στο σιτάρι τόσο από το τρακτέρ όσο και από τα ζιζάνια συνιστάται η εφαρμογή να γίνει όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: *Bromus spp.* (βρώμος), *Poa annua* (κοινή πόα), *Hordeum murinum* (αγριοκρίθαρο).

### Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

### Τρόπος εφαρμογής:

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Ψεκασμός υπό συνεχή ανάδευση, με ψεκαστήρες όλων των τύπων, μπεκ τύπου σκούπας και πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3-4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστάμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση και εντός ολίγων ωρών.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

**Σιτάρι (μαλακό, σκληρό):** Δεν ορίζεται, καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.



# SWORD® 240 EC

Γαλακτωματοποίησημο Υγρό (EC)  
Clodinafop-*proprargyl*  
(χημική ομάδα αρυλοφανοξυαλκανοϊκών)



Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστικές ουσίες: Clodinafop-*proprargyl* 24 % β/ο

(περιέχει ως αντιμυκητογόνο dimoxystrobin 5,55 % β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 76,61 % β/β

UFI: M6NW-63N1-2JAD-NVCX

**Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού (μαλακού και σκληρού)**

-Επιθάλας σε περίπτωση κατάποσης.

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

-Μπορεί να προκαλέσει θάλας στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

- Παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση δερματός ή σκάσιου.

- Περιέχει clodinafop-*proprargyl*. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.**

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**ΠΡΟΧΡΙΣΤΑΙ ΜΟΝΟ**

**ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

7950 / 01-03-2011

Κατοχος της οδους:  
Nufarm GmbH & Co. KG,  
25 St.-Peter-Strasse,  
A-4021 Linz, Austria

Παρασκευαστής:  
Nufarm EUROPE  
Ferdinandstrasse 11,  
40468 Dusseldorf,  
Γερμανία

Υπευθύνος επικοινωνίας / Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

**K&N**  
EARTH MATTERS  
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδός.  
Τηλ.: 2310 568656  
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:  
**500 κ.εκ. e**



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνεύετε σταγονίδια/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια. • Οι εργάτες και άλλοι δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μέχρι τα φυτά να στεγνώσουν. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά τα επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Μεταφέρετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη, σε καλά αεριζόμενο χώρο ή στον καθαρό αέρα και προστεψέψτε τον από την υποβρογχίτιδα.

**Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77793777

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

UFI: M6NW-63N1-2JAD-NVCX

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



Ημερομηνία παραγωγής: **Βλέπε φιάλη**  
Αριθμός παρτίδας:



**Nufarm**  
Grow a better tomorrow