

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Quizalofop-P-ethyl 5%

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Quizalofop-P-ethyl 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,5 % β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.

(CAS: 64742-94-5). Calcium dodecylbenzenesulphonate

(CAS 26264-06-2) / 2Ethylhexanol (CAS: 104-76-7),

Dodecan-1-ol, ethoxylated (CAS: 9002-92-0).

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα

Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe S.A.S

Parc d' Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 St-D Didier au Mont d' Or, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιτουτζιζάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - Agribiz, Ξενίας 1, 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 7471000

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στη αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος - Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ) : 70191/12-12-2016



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο επιφανειακό και πολυετών αγρωστικών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στελέχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ριζώμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΑΡΟΤΟ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την έναρξη της ανάπτυξης του εδωδίου μέρους, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΤΟΜΑΤΑ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ανάπτυξη της πλάσης βλαστικής με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΑΣΟΛΙ με λοβό, ΜΠΙΖΕΛΙ χωρίς λοβό: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΟΣΠΡΙΑ (Φασόλι, Ρεβίθια): Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΟΣΠΡΙΑ (Κουκιά): Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Βαμβάκι): Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας ως την έναρξη της καλλιέργειας των σπέρματος, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ (Σόγια): Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΠΑΤΑΤΑ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης / καλλιέργειας των σπέρματος, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΕΛΑΙΟΚΑΡΜΒΗ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΒΙΟΗΛΙΑΝΘΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα): Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή από το στάδιο της εμφάνισης του πρώτου φύλλου της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης/καλλιέργειας των

σπειρών, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. και για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 150-300 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΜΗΛΙΚΗ: Μία (1) μεταφυτρικτική εφαρμογή σε νεοσπαρθείσα μηδική είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, με εύρος δόσης για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτ./στρ.

Παρατηρήσεις:

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* (Αλεπενοσούρι), *Avena* sp. (Άντα), *Bromus* sp. (Βρόμος), *Digitaria sanguinalis* (Αμυγδαλόχοι), *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa phylloragron* (Μουράτο), *Hordeum vulgare* (Κριθάρι), *Lolium* sp. (Ήρκα), *Oryza rufipogon*, *Phalaris* sp. (Φαλαριές), *Sorghum halepense* (Βελουράς από σπόρο), *Trilicium aestivum* (Σιτάρι), **Πολυετή ζιζάνια:** *Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Sorghum halepense* (Βελουράς από ρίζωμα).

Μερικώς ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: *Setaria* sp. (Σετάρια), *Poa annua* (ετήσια Πόα), **Πολυετή ζιζάνια:** *Cynodon dactylon* (Αγριάδα).

Ανεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.

2. Εφαρμοζέται μεταφυτρικτικά ως προς την καλλιέργεια και το ζιζάνιο.

3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.

4. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αντίστοιχα με τη μεγαλύτερη δόση.

5. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο εμφάνισης του στελέχους ως και στο φύλλο σημείας.

6. Το *Sorghum halepense* καταπολεμάται καλύτερα με σπαρτή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 - 30 εκατοστά και 125 κ.εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις.

7. Η *Poa annua* καταπολεμάται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα.

8. Μη ψεκάζετε τον Ηλιάνθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.

9. Μη ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

10. Μη ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσιάζει άσχημο καιρό.

11. Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, μπαζιλιών και ηλιανθού, να μην αναμειγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιερηγική περίοδος: 1 εφαρμογή.

Ειδικές συστάσεις γεωργικής, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικής υπό της οποίας το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά ΗΡΑΕ. Να γίνεται έλεγχος ζιζανιοκτονίας με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμογή κατάλληλων αγρονομικών πρακτικών (π.χ. μεμψισπορά) για την αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων ζιζανίων.

• Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπέρματα.

• Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.

• Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

• Μη χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Targa 5 EC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογών και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φυτών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Διάθεση του περιεχόμενου/περιεχόμενου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. • Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό*.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον (εστώ και σε προέκτα). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε ιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ανακυκλώσετε. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Παραφορές για το γιατρό: Συμπτώματα: Κονένα συμπτώματα εάν είναι νύχτη σήμερα νύχτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία (απομείωση - παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταστεί απαραίτητο μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοτρωτές επιφανείες και τους δρόμους.)
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό: 21, Ζαχαρότευτλα: 60, Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά, Ρεβίθια), Ηλιανθος, Πατάτα, Βαμβάκι, Μηδική: 45, Ελαιόκαρμυ, Σόγια: 90.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ριχνούνται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστροφούν με τρίψιμο, αναμειγνύονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το φάρμακο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-30°C. Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας

