



ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

GROUP 29 INSECTICIDE

flonicamid

(χημική ομάδα πυριδινοκαρβοξυμιδίων)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Flonicamid 50% ββ
Βοηθ. ουσίες 47,92% ββ

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Περιέχει Disodium maleate.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 γρ.

Κάτοχος της άδειας, παρασκευαστής σκευάσματος:

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Pegasus Park, De Kleeflaan 12 b, Box 9 1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνη της τελικής διάθεσης στην αγορά:

K&N EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 470 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ.Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14511 / 29-5-2015



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διοσυστημικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΠΙΠΕΡΑΙΩΔΗ (Προκαλίει, Μοντανίει, Γκρέπφουρι, Κίτρι, Φόρτες, Νεραντζίει, Περγαμόντο): Για **Αφίδες εσπεριδοειδών** (*Aphis citricola*, *Toxoptera auranti*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 3,5-10γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινίει, Δαμασκινίει): Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Hyalopterus pruni*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwarzii*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Καρσιγιέ): Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwarzii*, *Hyalopterus pruni*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΜΗΛΟΙΔΗ (Μηλιέει): Για **Γκριζά Αφίδα** (*Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Eriosoma lanigerum*) και για **Πράσινη Αφίδα** (*Aphis rosae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΡΟΔΟΙΔΗ (Αγλαδίει, Κιλκινδιέει, Αγκυλιέει): Για **Αφίδες** (*Dysaphis rosae*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwarzii*, *Hyalopterus pruni*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτιει, Μελιτζάνει (υπαίθρου)): Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτιει, Μελιτζάνει (θερμοκηπίου)): Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτιει, Μελιτζάνει (θερμοκηπίου)) (για εφαρμογές με στάγδην άρδευση): Για **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα εναντίον της αφίδας σ' αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με 3 ώρες επιβεβαιωσής στάγδην άρδευσης και μία φυλλοκλίση. Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 Max (1 φυλλοκλίση, 2 με στάγδην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 200-500 λίτρα/στρέμμα.
ΚΟΚΚΥΝΟΙΔΗ (Αγριουριάει, Αγκυλιέει, Κολοκυθιάει): Για **Αφίδες** (*Aphis fabae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΣΙΤΑΡΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis nasturtii*, *Macrosiphum avenae*, *Macrosiphum dirhodum*, *Metopolophium dirhodum*, *Rhopalosiphum padi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΠΝΟΣ: Για **Αφίδες** (*Aphis fabae*) και για **Λιγνό*** (*Thrips tabaci*) (χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΠΝΟΣ (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταψεύσεως) (χρήση ήσσονος σημασίας):** Για **Αφίδες** (*Myzus nicotianae*, *Myzus sp.*, *Aphis sp.*) και για **Φόρτες** (*Thrips tabaci*). Εφαρμογή κατά τη μεταψεύση χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: max 2 (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταψεύσεως και 1 εφαρμογή φυλλοκλίση) με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*) και για **Λιγνό*** (*Thrips tabaci*) (χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 7,5γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.
ΑΡΑΚΑΣ (με λοβό) υπαίθρου (χρήση ήσσονος σημασίας):** Για **Αφίδες** (*Myzus persicae*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6^{ου} εξελιγμένου φύλλου χωρίς την παρουσία μελισσών⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 38-70 γρ./100 λίτρα χεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος χεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΣΚΑΡΟΦΙΛΟΣ (πικραλίη/πλατύφυλλα Ανθίδα, ΡΟΚΑ, ΑΥΚΟΤΡΙΒΩΔΩ, ΓΙΟΚΑΡΑΔΩ, Κόκκινο ΣΙΝΑΠΙ): Για **Αφίδες** (*Nasutococcus pisivorus*, *Aphis fabae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εμβλάση εφαρμογή του διακίου σταδίου πριν την μετακίνηση των νεαρών φυτάρων, από την ανάπτυξη του 1^{ου} φύλλου έως 6^{ου} φύλλου χωρίς την οινόη μέχρι το τέλος του φθινοπώρου. Δόση: 2 mg σκ/αντίστοιχο (σε 14 γρ. σκ/στρ.). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
ΜΠΙΖΙΛΙΑ ΜΕ ΛΟΒΟ: Για **Αφίδες** (*Acyrtosiphon pisum*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος χεκ. υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.
ΦΑΣΟΛΑ ΜΕ ΛΟΒΟ: Για **Αφίδες** (*Acyrtosiphon pisum*) και για **Aphis fabae** (χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος χεκ. υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.
ΟΞΥΡΙΑ (ΜΠΙΖΙΛΙΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ): Για **Αφίδες** (*Acyrtosiphon pisum*) και για **Aphis fabae** (χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του πρώτου πραγματικού φύλλου έως όταν το 10% των λοβών φτάσει το τυπικό μήκος του καρπού (την Άνοιξη, από Απρίλιο έως Οκτώβριο). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος χεκ. υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.
ΦΑΚΗ (οστράκι) (χρήση ήσσονος σημασίας):** Για **Αφίδες** (*Acyrtosiphon pisum*, *Aphis fabae*, *Aphis sp.*, *Macrosiphum sp.*, *Myzus sp.*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, από το στάδιο έκπτυξης του 1^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη άνθιση (έχει ανολίθη το 50% των ανθέων) (την Άνοιξη, από Μάρτιο έως Οκτώβριο). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος χεκ. υγρού: 20-60 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΛΑΜΑΚΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΣ (Λιουβούρα και Βερυκοκτινίει): Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμων⁽¹⁾. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΛΑΜΑΚΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΑΜΝΟΙ: Για **Αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum sp.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμων⁽¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος χεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Παράτηρήσεις:
1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιπτώσεις με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλά και ομοιόμορφη διανομή των φυτάρων.
4. Η εφαρμογή με εμβλάση/πρόληψη των διακίων μηχανικά, με στάγδην άρδευση, πριν την μετακίνηση να γίνεται 1 μέρα (μείον) πριν την καθορισμένη ημερομηνία μετακίνησης. Η δόση η οποία θα εφαρμοστεί να μην ξεπερνά τα 2 mg σκευάσματος/φυτό.
* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του θρίπτα στον καπνό (εφαρμογή με ψεκασμό), κατά του λιγνού στο βαμβάκι και κατά της αφίδας *Aphis fabae* στα φασόλια με λοβό και στα οστράκια φασόλι και μπιζέλι. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που οφείρονται στην αποτελεσματικότητα από την χρήση του σκευάσματος.
** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ανεπιθύμητες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καπνού (εφαρμογή με ριζοπότισμα), αρακά με λοβό, φακιάς και λουπιανού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που οφείρονται στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτότοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος ή εμβλάση/πρόληψη του διακίου σταδίου μαρουλιού και άλλων σαλατικών (μηχανικά με στάγδην άρδευση έως και 1 ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία μετακίνησης).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μείση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του ψεκαστικού υγρού στο υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Ξεπλύνετε με άθρονο νερό.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αξέλειο τελείως το ψεκαστικό βύτι. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποκαθαριθεί όλα τα τμήνα του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτι και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ανακαταρτισμό ξεπλύνετε πάλι με άθρονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, συνιστάται: - η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα - Εφαρμογή πρακτικής διασποράς και προστάσεων των υψηλών αρδευτικών, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις απολύτως απαραίτητες - Επιβεβαιωθεί με ΤΕΡΡΕΚΙ υγρό, από το πλάθισμα των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα - Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιάστημα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας - Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με ΤΕΡΡΕΚΙ - Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋποθέτουν της εφαρμογής) σε άρες που οι μελισσές δεν είναι ενεργές.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 8 ώρες στον αρακά και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

Προσέγγιση φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Τελικότητα επέμβασης πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: 75 ημέρες. Εσπεριδοειδή: 60 ημέρες. Μαρούλι, Σκαρφόλες (πικραλίη) Πλατύφυλλα Ανθίδα, Ρόκα, Αλευρώδεις, Γιοκάρωδο, Κόκκινο σιτάρι: 49 ημέρες. Σιτάρι: 28 ημέρες. Μηλιές, Αγκυλιές, Κιλκινδιές, Κόκκινο Σιτάρι: 21 ημέρες. Ροδακινίει, Δαμασκινίει, Κεράσι, Αρακάς (με λοβό), Μπιζέλια με λοβό, Φασόλια με λοβό: 14 ημέρες. Καπνός: 7 ημέρες. Αγριουριά, Κολοκυθιάει (θερμοκηπίου), Τομάτιει, Μελιτζάνει (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 1 ημέρα. Μπιζέλια (οστράκι), Φασόλια (οστράκι), Φακή (οστράκι), Λούπινο (οστράκι). Καταργείται από του χρόνου εφαρμογής.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο - μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Πλύνετε τα χέρια, βραχίονες και πρόσωπο αμέσως μετά το χειρισμό. - Να φοράτε προστατευτικό γιλέκο/προστατευτικά ενδυμασία/αποκρίνη προστασία για τα μάτια/προστασία. - Διόხση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. - Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/εφαρμογής. - Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. - Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τράκτερ ή καμήλα. - Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τράκτερ χωρίς καμήλα. - Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν εφαρμόζεται εντομοκτόνο που εκκρίνεται ή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αέριό. - Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά το καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. - Σε περίπτωση επείγουσας στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιδοβρωτές επιφανειακές του χώρου).
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αερίωση 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παύσεως μελισσών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν κόκκοι επικής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε τις επεξεργασίες. Εάν δεν υπάρχουν ο φασφωρικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε. Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε τις περιοχές που βρέχονται στις οποίες επέλεξε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άθρονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στο οποία επέλεξε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύντε τα πριν το ξαναφορέσετε.
Αντιβίο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιβίο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΗΡΩΣΙΑΣ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας (επιπλέον από πύξη ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστράφησαν προηγουμένως με τρίψιμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείστη όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
Συνθήκες απόθεσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκευθεί στην αρχική φαρμακεία συσκευασία του, σε χώρο ήπιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ
άνω μέρος της συσκευασίας.

5 200252 690263 >

