

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. • Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Να διατηρείται ο περιεκτής ερμητικά κλειστός. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό.

Γιατροί: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται χωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Δύο (2) χρόνια στην αρχική τιά, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Ημια παρασκευής: βλέπε φιάλη
Αριθμός παρτίδας:



THERBONAL

28,75 EC

etofenprox
(ετοφενπρόξ)


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: etofenprox 28,75% β/ο
βοηθ. ουσίες 69,29% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρεταμμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ζηρήτση δέρματος ή σκόμοιο.



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.

Παρασκευαστής: Mitsui Chemicals Agro, Inc., Ιαπωνία
Κάτοχος της άδειας - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14327 / 16-3-2009

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη εστερικό πυρεθροειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και συγκεκριμένα στη ρήν των ιόντων νατρίου στις μεμβράνες των νευρικών αξόνων.

ΘΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ: Για Καρπόκαφη (*Cydia pomonella*) στη δόση **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα**. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Για Φυλλοδέτη (*Adoxophyes orana*) στη δόση **50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα**. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινολογισμο σταφύλια): Για Ευδεμία (*Lobesia botrana*) στη δόση **50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα**. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΛΑΧΑΝΟ: Για Πιερίδα (*Pieris brassicae*) στη δόση **50 κ.εκ./στρέμμα, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα**. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-14 ημέρες. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (*): Για Μετκόλφα (*Metcalpha pruinosa*) στη δόση **50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα**. Ψεκασμός Φυλλώματος. Να διενεργείται μια εφαρμογή με την εμφάνιση των επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των ενηλικών του *Metcalpha pruinosa* καθώς και του παρασιτοειδούς *Neodryinus typhlocybae* όπου έχει εγκατασταθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

(*)Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην «μικρή σμάρδα», καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την προαναφερθείσα χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής ψεκαστικού υγρού:

Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υψίστασμα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξοφλιώνεται καλά και ομοιόμορφα καλύτερη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με **THERBONAL 28,75 EC**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναφέρονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Μήλα, Ροδάκινια, Λάχανο: 7 ημέρες -Αμπέλι: 14 ημέρες -Ακτινίδιο: Μη εφαρμοζόμενο