

verno[®] Cu30 + Zn30

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Γράψτε το φασκικό με το 3/4 της ποσότητας νερού και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα **verno[®] Cu30 + Zn30** στο συνεχές ανάδευση, διατηρείστε την ανάδευση καθόλη τη διάρκεια του φασκικού.

ΚΑΛΩΡΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Επιτραπέζια (Ποσειδάειο, Μοσχοκίτσο, Λαχανάκι Γαρίφαλο): Εφαρμόστε 200 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο, Επισκευάστε την εφαρμογή εάν κρίνετε απαραίτητα.

Αρβανίτι: Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), 4-6 εφαρμογές από την έναρξη της βλαστηκής περίόδου, πριν την άνθιση, κατά την άνθιση και στο στάδιο της καρποποίησης.

Μπιλιάνο: Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), 3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του βλαστηκής περιόδου και της καρποποίησης.

Παργουδάκι (Ροδάκι, Κόκκινο Βερίκοκο, Δαμάσκηνο): Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο, Επισκευάστε την εφαρμογή εάν κρίνετε απαραίτητα.

Μελιτζάνα (Νήλια, Αγκούρα): Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο, Επισκευάστε την εφαρμογή εάν κρίνετε απαραίτητα.

Ελάι: Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο, Επισκευάστε την εφαρμογή εάν κρίνετε απαραίτητα.

Ανθοράς (Αγγούρι, Καρδιά, Φασίλια, Φουντούκι, Καστανιά): Εφαρμόστε 150 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), την άνοιξη, πριν την άνθιση και/ή το φθινόπωρο, Επισκευάστε την εφαρμογή εάν κρίνετε απαραίτητα.

Αμπύλι: Εφαρμόστε 50-100 γρατόγραμμα (50-100 γρα100 λίτρα νερό), Πολυετή/ετή εφαρμογές στα στάδια πριν την άνθιση, μετά την άνθιση και μετά τη συγκομιδή.

Σταφύλι και γαρίφαλο (Στάφι, Ροδάκι, Φασίλια, Αρβανίτι, κ.λ.λ.): Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: α) πριν την άνθιση, όταν η καλλιέργεια έχει ύψος 10-15 εκ. και β) κατά το αρχικό στάδιο του σχηματισμού του καρπού.

Πατάτα: Εφαρμόστε 100 γρατόγραμμα (100 γρα100 λίτρα νερό), 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Σελανίτιες (Πατάτα, Βαμπακίσι, πατάτα, Γαρίφαλο): Εφαρμόστε 50-100 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: α) δύο εβδομάδες μετά τη μεταρύτευση, β) πριν την άνθιση, γ) και δ) στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών.

Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Καλαμπόκι, Καρπούζι): Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: Αγγούρι, Καλαμπόκι α) δύο εβδομάδες μετά τη μεταρύτευση, β) πριν την άνθιση, γ) και δ) στο στάδιο του σχηματισμού των καρπών. Καρπούζι: πολλαπλές εφαρμογές στα στάδια πριν την άνθιση, μετά την άνθιση και μετά τη συγκομιδή.

Σταφύλι (Μοσχοκίτσο, Λόχανο, Κουκουτσι): Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Κραμβάκι, Σαρόφι: Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: α) στο βλαστικό στάδιο και β) κατά το στάδιο του σχηματισμού του βολβού.

Καρότο, Πεννύλα: Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), 3-4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 2-3 εβδομάδων.

Καλαμπόκι: Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: 2 εβδομάδες μετά το φύτεμα των σπόρων και επανάληψη μετά από 1 μήνα.

Ρύζι: Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: α) στο στάδιο του 4ου φύλλου, β) στο αδελφάκι και γ) κυρίως στο στάδιο γεμισμένου του σπόρου.

Βασιλάκι, Κηφισό: Εφαρμόστε 25-50 γρατόγραμμα (50 γρα100 λίτρα νερό), Χρόνος εφαρμογής: α) στο στάδιο του 4ου φύλλου, β) στο αδελφάκι και γ) κυρίως στο στάδιο γεμισμένου του σπόρου.

Σε περίπτωση προφαναίας Cu απαιτείται και 4η εφαρμογή.

Προσοχή: Οι προσεκτικότερες δόσεις εφαρμογής που προϊόντος αποτελούν σύσταση. Συνιστάται στους γεωργούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους προκειμένου να προσαρμόσουν τις συστάσεις ανά περίπτωση και να αποφεύγουν την υπερβολική λίπανση.

Γενικά

Το **verno[®] Cu30 + Zn30** είναι ένα σύνθετο ανόργανο μακροβρεπτικό λίπασμα που περιέχει 30% μεταλλικό χαλκό και 30% μεταλλικό ψευδάργυρο. Προορίζεται για την αντιμετώπιση τροφωπενιών χαλκού και ψευδαργύρου.

Το **verno[®] Cu30 + Zn30** περιέχει τα θρεπτικά συστατικά σε μορφή ομοιομερών οξειδίου του χαλκού και οξειδίου του ψευδαργύρου, τα οποία προκαλούνται άμεσα στα φύλλα και στην επιφάνεια του φυτού και είναι άμεσα και για μεγάλο χρονικό διάστημα διαθέσιμα στις ποσότητες που το φυτό έχει ανάγκη.

Συνδυαστικότητα:

Η ανάμειξη με άλλα προϊόντα δεν συνιστάται όταν το pH του ψεκαστικού διαλύματος είναι μικρότερο του pH6. Συνιστάται να εκτελέσετε δοκιμή σε μικρή έκταση πριν προχωρήσετε σε καθολική εφαρμογή. Ζημιές από φυτοτοξικότητα συνήθως εμφανίζονται σε διάστημα 2 ημερών.

Φυτοτοξικότητα:

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ποικιλίες ευαίσθητες σε Cu και Zn.
- Εφαρμόστε, εάν είναι δυνατόν, τις πρώτες ώρες ή το απόγευμα, όταν υπάρχει μακρύτερη έκθεση στο φως του ήλιου.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης:

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής, όταν παραμένει στην αρχική συσκευασία και σε ξηρό περιβάλλον. Είναι ανθεκτικό σε παγετό.

verno[®] Cu30 + Zn30



Ανόργανο μακροβρεπτικό λίπασμα ΚΛΠ 1(Γ/Ω)(β)

Σύνθετο ανόργανο μακροβρεπτικό λίπασμα σε μορφή ομοιομορφικών οξείων για την αντιμετώπιση τροφωπενιών χαλκού - ψευδαργύρου.




Αναλυτική Σύθεση:

Χαλκός (Cu)	σε μορφή οξειδίου του χαλκού	300g/Kg (30%)
Ψευδάργυρος (Zn)	σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου	300g/Kg (30%)

Συστατικά:

Οξείδιο του ψευδαργύρου (CAS 1314-13-2) (ΚΣΥ): Χαλκός και Λόχανο (απόλυτο υδροξύλιο), Οξείδιο του χαλκού (CAS 1317-38-6) (ΚΣΥ), Αργκασουλφωρικό νάτριο (CAS 8061-61-6) (ΚΣΥ), Δολομίτης (CAS 10888-06-1) (ΚΣΥ).



ΦΥΛΑΞΕΤΑΙ ΚΑΘΙΣΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **1 κιλό (2x500γρ.)**

Παρασκευαστής: **σκεύασμα: NORDOX A.S.,** Νοκχόλη, Νοκχόλη 13, 140661 Ο.Φ., Norway
Tel: +47 23275500, www.nordox.no
Διανομή / ομοιομορφία:
KAN EYVYMΦAHE MABEE, BITEPA, T.E. 48.570 22, Σπάρος
Tηλ.: 2310 588696 - e-mail: info@kanymide.gr
Ημερίδα παραγωγής / Ημερίδα παρτίδας: (δείτε στη συσκευασία)



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Παλιό υδατό- και τοξικό υδατό-επιπονητικό, με παρασφραγισμένη συσκευασία.

ΔΙΑΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και ρούχα κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού υγρού με δεξαμενές νερού. Αν το φασκικό βυθίο δεν έχει αδειάσει με το πέρας του ψεκασμού, διαλύστε το υπόλοιπο σε 10λίτρα ποσότητα νερού και αδειάστε το εγκαθίσταται την καλήμέρινα.
- Να να αποφεύγετε τους κενόνοους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαράστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Επιδιώκετε προσεκτικά με νερό για 15 λεπτά. Συμβουλευθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:** Επιδιώκετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

Ημερίδα παραγωγής / Ημερίδα παρτίδας: (δείτε στη συσκευασία)



5 200252 691215

