



WETCIT



ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΟΡΦΗ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ALCOHOL ΕΤΗΧΟΧΥΛΑΤΕ
(ΑΙΘΟΞΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ) 8,15% β/β

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΈΩΣ.....100% β/β

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση του περιχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπλημματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Ημερομηνία παραγωγής:
βλέπε επι της συσκευασίας

Αριθμός παρτίδας:
βλέπε επι της συσκευασίας

ΔΙΑΝΟΜΗ



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΒΙΛΠΕ Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310 568556 • info@efthymiadis.gr • www.efthymiadis.gr
facebook.com/efthymiadis.gr/

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



Oro Agri International Ltd.

Bankastraat 75 • 9715CJ Groningen • Ολλανδία

Τηλ.: +31 50 820 04 11 • www.oroagri.eu
facebook.com/oroagri/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

5 λίτρα e



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το **WETCIT™** είναι επιφανειοδραστικό σκεύασμα που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ψεκασιμίων, μέσω της βελτίωσης της διασποράς, της διαβροχής και της διείσδυσης του ψεκαστικού υγρού, στις κηρώδεις επιφάνειες των φυτών, των εντόμων και των μυκήτων.

Το **WETCIT** λόγω του μοναδικού συνδυασμού συστατικών του, μειώνει δραστικά την επιφανειακή τάση του νερού, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο μέγεθος σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Το **WETCIT** προσδίδει στο ψεκαστικό υγρό αυξημένη διαβρεκτικότητα, επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη κάλυψη, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες και υδρόφοβες επιφάνειες. Το **WETCIT** βελτιώνει την επαφή με τα κηρώδη στρώματα των εντόμων και τις εξωτερικές υδρόφοβες δομές των μυκήτων, επιταχύνοντας έτσι τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ανάλογα με την εγκεκριμένη χρήση του αγροχημικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται).

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 100κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού ως γενικό διαβρεκτικό (για χρήση με μυκητοκτόνα επαφής, φυτορρυθμιστικές ουσίες, κ.ά).
- 150-300κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού για την αύξηση της διεισδυτικότητας των εντομοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των ζιζανιοκτόνων (δισουλφιματικά, διελασματικά, κ.τ.λ.)

Σε περίπτωση ανάμιξης του με φυτορρυθμιστικές ουσίες η δόση του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Όταν το **WETCIT** αναμειγνύεται με άλλη ουσία, πρέπει να ακολουθείται η κανονική προβλεπόμενη διαδικασία ανάμιξης του προϊόντος συνδυασμού. Το **WETCIT** πρέπει να προστίθεται τελευταίο στο δοχείο, όταν το δοχείο είναι γεμάτο κατά τουλάχιστον τα 2/3 του τελικού όγκου. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το εντός 24 ωρών μετά την ανάμιξη. Η αποτελεσματικότητα δεν επηρεάζεται από τη χρήση αντιαφριστικού.

Η δράση του **WETCIT** δεν επηρεάζεται από το pH του μίγματος ψεκασιμίου και αντίστροφα το **WETCIT** δεν έχει καμία επίδραση στο pH του μίγματος ψεκασιμίου.

Πριν από την πρώτη χρήση του **WETCIT** βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός ψεκασιμίου έχει καθαριστεί σχολαστικά, διότι το προϊόν μπορεί να συμπαρασύρει χημικά κατάλοιπα που έχουν παραμείνει στο ψεκαστικό δοχείο. Ελέγχετε συχνά τα φίλτρα του ψεκαστικού κατά την πρώτη εφαρμογή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το **WETCIT** συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Ωστόσο η συνδυαστικότητα του μπορεί να ελεγχθεί από τα προϊόντα συνδυασμού μέσα στο ψεκαστικό, γι' αυτό πριν την εφαρμογή του μίγματος στις καλλιέργειες - στόχους να πραγματοποιείτε μία δοκιμή σε μικρή κλίμακα.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη του **WETCIT** με σκευάσματα όταν το μίγμα προκειται να εφαρμοστεί σε καλλιέργειες των οποίων η ευαισθησία σε αυτά είναι ήδη γνωστή.

Να μη συνδυάζεται στο βύθιο με σκευάσματα που περιέχουν μίγμα Azoxystrobin+Difenoconazole ή Fosetyl-Al.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η χρήση του **WETCIT** κατά την περίοδο της καρποφορίας στην αγκλαδιά, τη μανταρινιά, το λωτό, τη ροδιά και το επιτραπέζιο σταφύλι μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να οδηγήσει στην εμφάνιση φυτοτοξικότητας σχήματος δαχτυλιδιού στη βάση των καρπών λόγω της συγκέντρωσης άλλων δραστικών ουσιών σε εκείνο το σημείο. Πριν την εφαρμογή συνιστάται η δοκιμή σε μικρή κλίμακα. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε τη συμβουλή του υπεύθυνου γεωπόνου σας.

- Να εφαρμόζεται το πρωί ή το βράδυ ώστε να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες.
- Να σταματάτε τον ψεκασμό πριν την έναρξη της απορρόφησης.
- Να χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη δόση των υπόλοιπων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε περίπτωση ανάμιξης πολλών σκευασμάτων με διαφορετικές δραστικές ουσίες.
- Να αποφεύγετε η εφαρμογή του **WETCIT** με σκευάσματα που περιέχουν θείο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό σε ευαίσθητα στάδια της καλλιέργειας (π.χ. άνθιση) και όταν το pH του ψεκ.υγρού είναι χαμηλότερο από 7.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα και την υγρασία.

Αποφεύγετε θερμοκρασίες κάτω από το 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.