

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

**CYFLAMID<sup>®</sup> 5 EW**


Η ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ  
στην Καταπολέμηση  
του Ωιδίου

# CYFLAMID®

## 5 EW

### ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το CYFLAMID® 5 EW είναι ένα μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου στα αμπέλια, στις μηλιές και στα πυρηνόκαρπα. Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου.



### ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δραστική ουσία **Cyflufenamid** ανήκει στην ομάδα των αμινοξιδιμίων. Διαθέτει έναν **νέο μηχανισμό δράσης (FRAC U6)** και **δεν εκδηλώνει φαινόμενα διασταυρωτής ανθεκτικότητας** με τις ήδη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Επομένως το **CYFLAMID®** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ήδη ανθεκτικών (σε άλλες δραστικές ουσίες) στελεχών ωιδίου, καθώς και να συμπεριληφθεί σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Το **CYFLAMID®** έχει δράση σχεδόν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του παθογόνου, παρεμποδίζοντας την **πρωτογενή ανάπτυξη του μυκηλίου** και της **μυζητικής πλάκας (haustoria)**, τη **δευτερογενή ανάπτυξη** του μυκηλίου και της **σποριογένεσης**.

Το **CYFLAMID®** αμέσως μετά την εφαρμογή του μετακινείται διελασματικά στο εσωτερικό των φυτικών ιστών, προσφέροντας **αντοχή στην έκπλυση** από τη βροχή (έως μία ώρα). Επιπλέον, διαθέτει υψηλή τάση ατμών, ανακατανέμεται στην ευρύτερη περιοχή του φυτού από το σημείο όπου εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα την **καλύτερη κάλυψη του φυτού**.



### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο	PHI (ημέρες)
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.			
<b>Αμπέλι</b> (Οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	40-50	50	80 - 100	Προληπτική επέμβαση από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την ανάπτυξη των ραγών.	2/10-14 ημέρες	21
<b>Μηλιά</b>	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	30-50	50	90-150	Προληπτικές επεμβάσεις από τα πρώτα ξεδιπλωμένα φύλλα μέχρι πριν τη συγκομιδή.	2/7-10 ημέρες	14
<b>ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ!</b> <b>Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά (*), Δαμασκινιά (*)</b>	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ή <i>Podosphaera pannosa</i> )	25-50	50	50-100	Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο των πλήρως αναπτυγμένων φύλλων μέχρι πριν τη συγκομιδή.	2/7 ημέρες	14

(\*) Χρήσεις ήσσονος σημασίας

### Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος φυλλώματος



**Παρατηρήσεις:** • Η δόση και ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών και τη φυλλική επιφάνεια. • Εφαρμόστε το CYFLAMID® 5 EW όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά τις πρώτες ενδείξεις προσβολής από το ωίδιο. • Όπου η πίεση της ασθένειας παραμένει υψηλή ή υπάρχει επαναπροσβολή, μπορεί να επαναληφθεί ο ψεκάσμος. Εφαρμόζεται 2 φορές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες εάν υπάρχει πίεση από την ασθένεια. • Το προϊόν διαθέτει εκλεκτικότητα στα ωφέλιμα αρθρόποδα της οικογένειας Phytoseiidae. • Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας Κερασιά και Δαμασκινιά: δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

# CYFLAMID® 5 EW

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Νέα δραστική ουσία και τρόπος δράσης με σημαντικές ιδιότητες (τάση ατμών, διελασματικότητα).
- Εξαιρετική προληπτική δράση.
- Καλή θεραπευτική δράση.
- Μεγάλη υπολειμματική δράση στο παθογόνο.
- Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (έως 1 ώρα).
- Έλεγχος ανθεκτικών στελεχών του ωιδίου.
- Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλα ωιδιοκτόνα.
- Εκλεκτικό ως προς τα ωφέλιμα αρθρόποδα της οικογένειας Phytoseiidae.
- Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.



	<b>CYFLAMID® 5 EW</b>
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	60370 / 21.05.2013
Δραστική ουσία	Cyflufenamid 5% β/ο (51,3 γρ./λίτρο)
Μορφή σκευάσματος	Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
	- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<b>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</b>	
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	



Κάτοχος της άδειας: Nisso Chemical Europe GmbH

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 568656, Φαξ, 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ, 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

[www.efthymiadis.gr](http://www.efthymiadis.gr)

 K&N Efthymiadis

